



Universidad Nacional
SAN LUIS GONZAGA



[Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

Esta licencia permite que otros distribuyan, mezclen, adapten y construyan sobre su trabajo, incluso comercialmente, siempre que le reconozcan la creación original. Esta es la licencia más complaciente que se ofrece. Recomendado para la máxima difusión y uso de materiales con licencia.

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA

FACULTAD DE OBSTETRICIA

UNIDAD DE INVESTIGACION



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N° 090-UI-FO-UNICA-2025

EVALUACION DE ORIGINALIDAD

CONSTANCIA

La que suscribe deja constancia que se ha realizado el análisis con el software de verificación de similitud al documento cuyo título es:

Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023

Presentado por:

Bach. AZURZA RAMOS FATIMA ZENAIDA

Autor del proyecto de tesis del nivel **PREGRADO** de la Facultad de **Obstetricia**. Habiendo obtenido un resultado del **1%** por el cual se otorga el calificativo de:

APROBADO


Según Reglamento de Evaluación de Originalidad de los Documentos de investigación, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 1668-R-UNICA-2020.

Se adjunta al presente el reporte de evaluación con el software de verificación de originalidad.

El Informe Final de Tesis, se encuentra dentro de los parámetros de similitud que establece el Reglamento de Evaluación de la Originalidad de los documentos de investigación, de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga."

Ica, 04 de agosto del 2025

Recibo de Pago (Boucher) N° 860774

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
FACULTAD DE OBSTETRICIA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Dra. CARMEN LUISA CHAUCA SAAVEDRA
DIRECTORA

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Facultad de Obstetricia



Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en
estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis
Gonzaga, 2023

Línea de investigación

Salud pública y Conservación del Ambiente

INFORME FINAL DE TESIS PARA OPTAR EL TITULO
PROFESIONAL DE LICENCIADO EN OBSTETRICIA

AUTOR:

Bach. AZURZA RAMOS FATIMA ZENaida

Ica – Perú

2025

DEDICATORIA

Dedico este estudio a Dios, mi guía constante y fuente inquebrantable de fortaleza, por acompañarme en cada etapa de este camino académico.

A mis padres, cuyo amor incondicional y entrega han sido fundamentales para alcanzar este logro. Agradezco profundamente las enseñanzas que me han dejado y el afecto que siempre me han ofrecido. Es difícil poner en palabras toda la gratitud que siento por ustedes. Esta tesis representa un homenaje a su ejemplo de vida y a la admiración profunda que tengo hacia ambos. Gracias por ser un pilar insustituible en mi vida.

A la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, así mismo a la Facultad de Obstetricia, docentes por sus enseñanzas otorgadas en cada una de sus aulas.

AGRADECIMIENTO

Al cerrar una etapa significativa en mi vida, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a quienes hicieron realidad este sueño de alcanzar la titulación. A todas las personas que han estado a mi lado durante este viaje, siendo una fuente continua de motivación, respaldo y fortaleza.

Un agradecimiento especial a Dios, a mis progenitores y a toda mi familia por enseñarme a través de sus actos que el amor genuino se manifiesta en el anhelo sincero de ver a los demás progresar y mejorar. Agradezco de corazón por su constante compañía.

Mi gratitud también, a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Facultad de Obstetricia, así mismo a mi asesora de tesis la Dra. Carmen Rosa Laos de Ajalcriña. Agradezco a cada maestro que, con su ayuda y conocimiento, forman parte del fundamento de mi carrera profesional.

INDICE DE CONTENIDOS

Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iii
Indice de contenidos.....	iv
Indice de tablas.....	v
Indice de figuras.....	vi
Resumen.....	vii
Abstract.....	viii
I. INTRODUCCIÓN.....	9
II. ESTRATEGIA METODOLÓGICA.....	18
III. RESULTADOS.....	20
IV. DISCUSIÓN.....	41
V. CONCLUSIONES.....	43
VI. RECOMENDACIONES.....	44
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	45
VIII. ANEXOS.....	47

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Prueba de Normalidad	20
Tabla 2: Edad de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad San Luis Gonzaga, 2023.....	20
Tabla 3: Estado civil de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.	21
Tabla 4 : Ciclo actual que están cursando los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.....	22
Tabla 5: Ocupación de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.	23
Tabla 6: Religión de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga,2023.....	24
Tabla 7 : Inseguridad en la relación con su pareja de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.....	25
Tabla 8 : ¿Te sientes preparada para enfrentar este tipo de responsabilidad (embarazo)?	26
Tabla 9 : ¿Tienes temor de utilizar algún método anticonceptivo?.....	27
Tabla 10: Edad de inicio sobre las relaciones sexuales de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga,2023.....	28
Tabla 11: Utilización de un método anticonceptivo de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.....	29
Tabla 12: Relaciones sexuales sin protección de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.....	30
Tabla 13: Frecuencia de relaciones sexuales de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.....	31
Tabla 14: Parejas sexuales de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.	32
Tabla 15: Uso del anticonceptivo de emergencia en los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.....	33
Tabla 16: Relación entre Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.....	34
Tabla 17: Relación entre los Factores socio- demográficos y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.....	36
Tabla 18: Relación entre los Factores personales y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.....	37
Tabla 19: Relación entre la Conducta Sexual y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.....	39

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Edades de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.....	21
Figura 2: Estado Civil de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.	22
Figura 3 : Ciclo actual que están cursando los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.	23
Figura 4: Ocupación de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.	24
Figura 5: Religión de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga,2023.	25
Figura 6 : Inseguridad en la relación con su pareja de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.....	26
Figura 7 : ¿Te sientes preparada para enfrentar este tipo de responsabilidad (embarazo)?	27
Figura 8: ¿Tienes temor de utilizar algún método anticonceptivo?	28
Figura 9: Edad de inicio sobre las relaciones sexuales de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga,2023.....	29
Figura 10: Utilización de un método anticonceptivo de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.....	30
Figura 11: Relaciones sexuales sin protección de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.	31
Figura 12: Frecuencia de relaciones sexuales de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.	32
Figura 13 : Parejas sexuales de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.	33
Figura 14: Uso del anticonceptivo de emergencia en los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.....	34
Figura 15: Relación entre Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.	35
Figura 16: Relación entre los Factores socio-demográficos y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.	36
Figura 17 : Relación entre los Factores personales y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.	38
Figura 18: Relación entre la conducta sexual y uso del anticonceptivo de emergencia.	40

RESUMEN

Este estudio tiene como título Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga,2023.

Objetivo: Determinar la relación entre los Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga,2023.

Metodología: El tipo de investigación fue cuantitativo, de estudio básica, prospectivo y corte transversal; nivel relacional, diseño no experimental. La población de 199 y muestra de 132 estudiantes, aplicando como técnica la encuesta y de instrumento el cuestionario.

Resultados: Los Factores predisponentes fueron el factor sociodemográfico la edad de 19 a 23 años 60,6%, estado civil soltera 81,8%, ciclo que cursaban IV-VI 37,9%, ocupación estudiante 78,0%, religión católica 73,5%. En los factores personales se encontró que no presentan inseguridad con su pareja 72,0%, se sienten preparada para enfrentar alguna responsabilidad 63,3%, no tienen temor de utilizar algún método anticonceptivo 72,05%, en la conducta sexual se determinó que iniciaron relaciones sexuales entre 19 a 24 años un 77,3 %, utilizaron método anticonceptivo 75%, tuvieron relaciones sin protección 55,3%, la frecuencia de relaciones sexuales fue semanal 44,7% y han tenido solo 1 pareja sexual 68,2%, respecto al uso del método de emergencia se observó que se realiza después de cada relación sexual 56,8%.

Conclusión: Se logró determinar que no existe una relación entre los Factores predisponentes y el uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga,2023.

Palabras claves:

Factores, anticonceptivo de emergencia, estudiantes.

ABSTRACT

This study is titled Predisposing factors and use of emergency contraception in obstetrics students at the National University of San Luis Gonzaga, 2023.

Objective: To determine the relationship between predisposing factors and the use of emergency contraception in obstetrics students at the National University of San Luis Gonzaga, 2023.

Methodology: The research was quantitative, basic, prospective, and cross-sectional; relational in nature, and non-experimental in design. The population was 199 and the sample was 132 students. The technique used was a survey and the instrument used was a questionnaire.

Results: The predisposing factors were the sociodemographic factor age 19 to 23 years 60.6%, marital status single 81.8%, cycle they were in IV-VI 37.9%, occupation student 78.0%, Catholic religion 73.5%. In personal factors it was found that they do not present insecurity with their partner 72.0%, they feel prepared to face any responsibility 63.3%, they are not afraid to use any contraceptive method 72.05%, in sexual behavior it was determined that they started sexual relations between 19 to 24 years 77.3%, used a contraceptive method 75%, had unprotected relations 55.3%, the frequency of sexual relations was weekly 44.7% and have had only 1 sexual partner 68.2%, regarding the use of the emergency method it was observed that it is performed after each sexual relation 56.8%.

Conclusion: It was determined that there is no relationship between predisposing factors and the use of emergency contraception in obstetrics students at the National University of San Luis Gonzaga, 2023.

Keywords:

Factors, emergency contraception, students.

I. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, el gobierno promueve la planificación familiar a través de una variedad de programas, y hay una variedad de métodos anticonceptivos disponibles en el mercado local que no parecen vincular el conocimiento del tema con el uso de estos métodos. Por lo tanto, a menudo tienen que tomar medicación oral. (1)

La limitada accesibilidad a servicios de salud reproductiva se ve influenciada por diversas barreras de índole sociocultural, económica y religiosa, siendo especialmente relevante la deficiente comunicación entre padres e hijos. Esta combinación de factores contribuye a la ocurrencia de relaciones sexuales a edad temprana, embarazos no planificados e incluso interrupciones del embarazo, como consecuencias directas de dichas limitaciones.

La detección temprana de condiciones en dificultad en los embarazos reduce los trastornos en la maternidad, complicaciones y la cantidad de muertes relacionadas a la gestación. A nivel mundial, el embarazo joven se calcula entre el 15 y 25 % en su totalidad, lo cual genera riesgos, quienes, con el objetivo de detener la gestación no planificada, se inducen a abortos representando cerca de 73 millones de casos alrededor del planeta anualmente. (1)

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2019 se calcularon en países tercermundistas 21 millones de embarazos jóvenes cada año, de los cuales la mitad (50.0%) no tenían planificación. Este tema sigue representando un reto para todo el personal de gineco obstetricia, ya que las campañas de planificación familiar muchas veces parecen no ser suficientes en la conciencia y en su magnitud, que un embarazo no planeado representa a nivel social de un país y en sus propias vidas. Si bien es cierto que la tasa de natalidad en adolescentes y mujeres jóvenes ha disminuido, los porcentajes siguen siendo dispares entre regiones. (2)

El Ministerio de Salud (MINSA) recomienda su uso exclusivamente como una medida excepcional, tales como la actividad sexual impulsiva o casos de violencia sexual. La eficacia esperada del levonorgestrel puede ser de hasta 95% antes de las 72 horas. (3)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que existen diferentes efectos secundarios del uso de la píldora de emergencia, las cuales son náuseas, vómitos, dolor de cabeza intenso, atraso menstrual o irregularidad en la menstruación. Por otro lado, el uso desmedido de la píldora aumenta el ciclo menstrual ocasionando muchas veces desfases e irregularidades. Asimismo, en su mayoría, comparables a los que se presentan con el uso de anticonceptivos orales regulares, teniendo en cuenta que se experimentan vómitos durante las dos primeras horas de consumo del anticonceptivo. Se observó además que las mujeres obesas son menos propensas a obtener los beneficios, es decir, las píldoras de emergencia son menos eficaces. (4)

Un estudio publicado en la revista The Lancet, más de 160 millones de mujeres de la región del Sur de Asia y subsahariana no tienen acceso a los anticonceptivos que necesitan siendo la falta de recursos el principal motivo para el caso, además de la poca voluntad política y de acciones del

personal de salud de esos países. En el caso de Perú, teniendo presentes los registros de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), se concentra en los resultados para las mujeres casadas y/o convivientes teniendo que más de tres cuartos de la población se encontraban utilizando anticonceptivos en el momento de la entrevista (78.1%), de las cuales 54.5% usan métodos modernos y el 20.8% tradicionales. (5)

Dentro de los Antecedentes Internacionales de la investigación encontramos:

Tenaw Alemu L (Etiopía 2022); se realizó una investigación con el fin de identificar el uso y los factores determinantes el empleo del anticonceptivo entre mujeres que solicitan la interrupción del embarazo en el Noroeste de Etiopía. El diseño del estudio fue transversal y de tipo descriptivo con una muestra conformada por 397 mujeres. Como herramienta para recolectar datos se utilizó un cuestionario estructurado. Los principales hallazgos indicaron que el 48.1% de las participantes tenían entre 20 a 24 años, mientras que el 19.2% había utilizado la píldora anticonceptiva de emergencia. Asimismo, el 79.1% residía en zonas urbanas, 87.9% profesaba la religión ortodoxa, el 64.7% era soltera, el 34% tenía estudios secundarios y el 76.1% no tenían hijos. El estudio concluyó que la probabilidad de uso de anticonceptivos de emergencia fue significante mayor entre mujeres que vivían en áreas urbanas (razón de probabilidades [OR]:2.3), aquellas con nivel educativo secundario (OR: 3.28) y entre quienes no tenían hijos (OR:4,2). (6)

Yeboah Sarpong D, et al (Ghana 2022); desarrollaron un estudio con el propósito de verificar las condiciones en la que se da el uso de anticonceptivo de emergencia entre mujeres en el Municipio de Kwadaso, Ghana. El diseño metodológico fue de tipo descriptivo y transversal, y se tuvo una muestra de 312 mujeres. En la recopilación de datos se empleó una encuesta estructurada. El resultado reveló que el 79.67% de las participantes habían utilizado anticoncepción de emergencia al menos una vez. Entre los motivos principales, el 59.83% lo hizo tras mantener relaciones sexuales sin protección y no planificadas, mientras que el 24.69% reportó haber recurrido a este método debido a fallos en el coito interrumpido. En cuanto a los factores sociodemográficos, el 48.08% de las encuestadas tenían más de 25 años, el 85.58% se identificaba con la religión cristiana, el 38.14% contaba con estudios universitarios, y el 65.71% era soltera. Desde el punto de vista económico el 54.49% declaró tener un empleo remunerado. El estudio concluyó que se usaron pastillas de emergencia en un uso superior a la media fue elevado, y que los principales factores asociados a su utilización fueron la religión y el nivel de ingreso mensual. (7)

Pedraza Villamil M (Bogotá 2020); Llevaron un estudio que tuvo como objetivo la evaluación y el uso de anticonceptivos de emergencia entre mujeres universitarias en la ciudad de Bogotá 2020. Tuvo una visión metodológica observacional y descriptiva. Contó con una muestra de 354 estudiantes. Esta investigación tuvo como resultado que la edad de mayor frecuencia entre las participantes fue de 21 (13.6%), seguida por aquellas de 19 años (12.3%), siendo la mayoría de sexo femenino (78.0%). Asimismo (86.6%) de las encuestadas manifestó tener una vida sexual

activa, y el (85.1%). Utilizó un anticonceptivo de emergencia, siendo la píldora del día siguiente (Levonorgestrel) el más usado con (98.6%), además que el (55.8%) fue recomendado por un familiar, amigo y/o pareja sexual. El tiempo de uso del anticonceptivo de emergencia se compuso de máximo 12 horas después (56.9%), máximo 24 horas después (33.4%), máximo 48 horas después (6.0%), máximo 72 horas después (2.6%) y menos de 12 horas (1.1%). (8)

Rodas Pacurucu J, et al (Ecuador 2020) Llevaron a cabo una investigación teniendo como objetivo identificar el nivel de sapiencia y la relación con el uso de la pastilla del día siguiente entre estudiantes de Enfermería de la Universidad de Cuenca 2020. Este estudio se enmarcó en un enfoque cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, y contó con una muestra de 249 participantes. El resultado de esta investigación identificó que el grupo etario de mayor representación fue de 17 a 21 años (74.7%), predominando el sexo femenino (79.5%) y el estado civil soltera (94.0%). En la relación con el uso de Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) se observó que el 69.4% lo había utilizado entre 0 y 2 veces durante el último año, mientras que el 38.55% manifestó no haberlo utilizado nunca. (9)

Pillajo Álvarez F (Ecuador 2020); Desarrollaron un estudio con el propósito de relacionar el uso de Anticonceptivo oral de emergencia (AOE) con los factores asociados en mujeres que se apersonaron al centro de salud Anidados en Otavalo. La investigación fue de tipo descriptivo, prospectivo y transversal, con un enfoque cuantitativo y diseño no experimental. La muestra se conformó por 42 usuarias y se usó una encuesta. Entre los principales hallazgos, se reportó que el 23.81% de las participantes tenía entre 15 y 19 años, la mayoría eran solteras, de religión católica. Adicional a ello se desconocía el método con un 38.10%. respecto a las condiciones adversas, el 46.62% presentó náuseas y 45.24% cefalea. Se reveló que el 45.24% tenía entre 22 y 26 años, el 47.62% eran solteras y con estudios secundarios, y el 69.05% profesaban la religión católica. La promiscuidad de adolescentes se situó en los 13 a 18 años, el 40.48% refirió haber tenido dos parejas sexuales, y el 30.9% reportó mantener una buena relación familiar, además, el 54.76% indicó no consumir alcohol, 69.05% consideró que la píldora es de fácil acceso, y el 34.38% señaló que recibió información sobre el método por parte de una amiga. Como conclusión el nivel de información, la accesibilidad al fármaco y la influencia de los vínculos sociales. (10)

En los Antecedentes Nacionales Encontramos:

Quispe Huamani E, et al (2022); Ese estudio evaluó los factores asociados con el uso del anticonceptivo oral de emergencia (AOE) en mujeres de 15 a 30 años en el distrito de Santa Clara perteneciente a Ate. Su metodología fue descriptiva en 284 mujeres en el distrito de Ate-santa clara. Los resultados fueron del total de la muestra, se tuvo que las de edad entre 22 a 25 años sí utilizan el AOE en el 27.8%, el 18.9% con estado civil conviviente, 27.5% amas de casa, 45.8% tienen religión católica, 33.5% con grado de instrucción secundaria. En relación a la frecuencia de uso el 51.8% lo utilizan a veces. Se concluyó que existe distintas condiciones

sociodemográficas y que estas pueden guardar relación con el uso del anticonceptivo como son la edad, estado civil, amas de casa, la religión católica, y el grado de instrucción. (11)

Quispe Dávila E (2022); Realizó un estudio con el objetivo de determinar los factores relacionados al uso de la píldora del día siguiente en adolescentes de la Institución Educativa Secundaria Santa Rosa Puno 2021 con la investigación de tipo descriptivo relacional, prospectivo; la muestra la conformaron 134 alumnas de secundaria; se usó un cuestionario validado. Llegando a los resultados que, dentro de los factores sociales se encontró que las edades de 16 a 17 años eran el 26.4%, el 20.8% tuvieron una sola vez relaciones sexuales, 29.2% tuvo una sola pareja sexual y usaron en una sola oportunidad la píldora de emergencia. En los factores culturales 28.3% contaba con información sobre el anticonceptivo donde el 22.6% tuvieron relaciones sexuales sin protección; el 25.5% eran católicas y utilizaron el método en una sola oportunidad, Concluyendo que existe relación entre la edad y el inicio de la actividad coital. (12)

Olivares Rugel S (2022); Llevo a cabo un estudio con el objetivo de identificar los factores asociados al uso inadecuado de la anticoncepción oral de emergencia (AOE) entre estudiantes universitarias de la ciudad de Piura, durante el periodo 2021-2022. La investigación se enmarco en un diseño observacional, retrospectivo, transversal y de tipo analítico. La muestra estuvo compuesta por 384 alumnas; y se utilizó la encuesta como instrumento de recolección de datos. Los resultados mostraron que el 55.21% de las participantes había utilizado anticonceptivos orales de emergencia de manera incorrecta. Asimismo, se observó que variables como la satisfacción con la vida y la calidad de la comunicación con los padres no presentaban una asociación significativa con el uso inadecuado de este método. El estudio concluyó que la conducta sexual de alto riesgo se comporta como un factor asociado al uso inapropiado de la anticoncepción de emergencia. (13)

Ramírez Quispe N (2020); Desarrolló una investigación con el objetivo de identificar los factores asociados al uso de la anticoncepción oral de emergencia entre estudiantes adolescentes del quinto año de secundaria del colegio mariscal Cáceres, en la ciudad de Ayacucho, Durante el año 2019. con el estudio descriptivo relacional, transversal y prospectivo; el instrumento utilizado fue la encuesta estructurada. Llegando a los resultados que el 32.1% refirió haber utilizado la píldora de emergencia, de los cuales, el 84.1% tenía edades entre 16 a 17 años $p= 0.000$; el 87.6% proceden de la zona urbana, de los cuales el 32.1% utiliza la píldora, $p= 0.002$; el 59.1% refiere utilizar las píldoras para evitar el embarazo no planificado, 27.3% por ser adolescentes, 9.1% refirió que lo usó por violación sexual. De las alumnas que los usaron manifestaron que el 34.1% fue por recomendación de una amiga, 27.3% porque vio en internet y 13.6% por recomendación de la pareja, Se Concluyó que existe relación entre el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia y la edad, procedencia. (14)

Horna Rodriguez C (2020); Llevó a cabo un estudio con el propósito de identificar los factores que inciden en el uso de Levonorgestrel (LNG) como método de anticonceptivo de Emergencia

en población adolescentes. La investigación adoptó un diseño analítico, observacional, prospectivo y de corte transversal; con una muestra de 264 adolescentes de secundaria y universitarios en Trujillo; tomando como instrumento una encuesta. En los resultados obtenidos encontramos que la edad promedio del consumo de estos anticonceptivos fue de 16 ± 1.12 ; teniendo una prevalencia del 25.4%. Dentro de los factores se observó dentro de la conducta sexual, las relaciones sexuales no planificadas $p= 0.000$, precio al alcance de la adolescente $p= 0.000$, disponibilidad en las farmacias $p= 0.008$. No hay relación entre el uso del Levonorgestrel y el conocimiento del mecanismo de acción $p= 0.326$ o el tiempo del efecto del anticonceptivo $p= 0.310$. Los adolescentes iniciaron su vida sexual en el 50.76% de ellos, Concluyó que la mitad de los adolescentes, es decir 1 cada 2 adolescentes ya iniciaron su vida sexual, el 62% tienen relaciones sexuales sin planificar y 54.2% consume píldora oral de emergencia. (15)

Formulación del problema

Problema General

¿Cuál es la relación entre los Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023?

Problemas Específicos

PE1: ¿Cuál es la relación entre los Factores sociodemográficos y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023?

PE2: ¿Cuál es la relación entre los Factores personales y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023?

PE3: ¿Cuál es la relación entre la Conducta Sexual y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023?

Justificación e importancia de la investigación

La justificación metodológica de este estudio es importante porque los resultados servirán de consulta para otros estudios semejantes y la investigación de consulta para los estudiantes y el personal de salud. Además, con los resultados surgirán nuevas interrogantes que serán motivo de nuevas investigaciones.

La justificación práctica es que con nuestro estudio se contribuirá a ampliar los conocimientos sobre el anticonceptivo de emergencia y de esta manera el aporte de esta investigación sea involucrado pueda identificar de qué modo se está utilizando esta píldora por parte de las estudiantes; de esta manera se podrán realizar actividades preventivas a nivel de los universitarios para que así hagan un buen uso del anticonceptivo de emergencia.

La justificación social se enmarca en que los resultados favorecerán a las estudiantes universitarias para evitar que la píldora de emergencia se utilice en forma periódica, evitando de esta manera las alteraciones del eje hipófisis - hipotálamo y ovario; al favorecer a las estudiantes también se favorece en forma indirecta a sus familias y comunidad en general.

a) **Importancia:** Este estudio reviste una importancia significativa en el ámbito educativo, ya que contribuirá como base referencial para futuras investigaciones. Asimismo, los resultados permitirán identificar y analizar en detalle los factores que inciden en la adopción del anticonceptivo de emergencia por parte de la población estudiantil. Desde una perspectiva profesional, los hallazgos facilitarán una reflexión crítica sobre la coherencia entre la formación académica recibida y las prácticas personales, lo cual resulta fundamental para la formación de profesionales con empatía, sólidos conocimientos y capacidad de pensamiento crítico.

b) **Aportes:** Este estudio proporciona información pertinente sobre las conductas reproductivas de las futuras profesionales en obstetricia, quienes desempeñarán un rol clave en los ámbitos de educación, promoción y prevención en salud sexual y reproductiva. Los hallazgos permitirán fortalecer su formación integral y optimizar las estrategias de intervención orientadas a mejorar la calidad de atención en esta área crítica de la salud pública.

c) **Soluciones:** Este estudio permite una comprensión más profunda de las experiencias y percepciones de las estudiantes, lo cual contribuirá al desarrollo de una pedagogía más efectiva y a la implementación de acciones orientadas al uso adecuado, informado y responsable del anticonceptivo. Asimismo, los resultados servirán de base para el diseño de estrategias de educación sexual contextualizadas y culturalmente pertinentes, que promuevan una formación integral en salud sexual y reproductiva, abarcando dimensiones científicas, éticas y personales.

Objetivo General:

Determinar la relación entre los Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

Objetivos Específicos:

OE1: Determinar la relación entre los Factores sociodemográficos y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

OE2: Determinar la relación entre los Factores personales y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

OE3: Determinar la relación entre la Conducta Sexual y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

Hipótesis y variables de la investigación.

a) Hipótesis General:

Existe relación entre Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

b) Hipótesis Específicas:

HE1: Existe relación entre los Factores sociodemográficos y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

HE2: Existe relación entre los Factores personales y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

HE3: Existe relación entre la Conducta Sexual y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

Variables:

a) **V. Dependiente:** Anticonceptivo de emergencia

b) **V. Independiente:** Factores Predisponentes

Operacionalización de variables:

Variable	Definición	Dimensiones	Indicadores	Nivel de medición
V. Dependiente: Anticonceptivo de emergencia	Referido al método que se puede utilizar para prevenir un embarazo después de una relación sexual recomendado su uso dentro de los 3 días posteriores al coito.	Utilización	Frecuencia de utilización	1 vez al año 2 a 3 veces al año 4 a 5 veces al año Después de cada relación sexual
V. Independiente: Factores predisponentes	Dicha condición, que nos exhibe a un peligro que agranda la probabilidad de que el ser humano brote o muestre algún signo de alguna enfermedad.	Factores socio-demográficos	Edad Estado civil Ciclo que cursa Ocupación	Menor de 19 años De 19 a 23 años 24 a más años Soltera Casada Conviviente I a II ciclo III a IV ciclo V a VI ciclo VII a VIII ciclo Sólo estudiante Con trabajo dependiente

				Con trabajo independiente
			Religión	Católica Evangélica Atea
			Inseguridad en la relación	Si No
		Factores personales	Te sientes preparada para enfrentar este tipo de responsabilidad	Si No
			Temor a un método	Si No
			Inicio de RRSS	Menor de 15 años 16 a 18 años 19 a 24 años ≥ 25 años
			Utilizó algún método anticonceptivo	Sí No
			Tuvo RRSS sin protección	Sí No
		Conducta sexual	Frecuencia de RRSS	Semanal Cada 15 días Cada mes Mayor a 1 mes
			Nº de parejas sexuales,	1 2 a 3 Más de 3

Fuente: Elaboración propia del autor

Base teórica

Salud Sexual: Es un elemento fundamental para el desarrollo individual del ser humano, con la pareja o con la familia. Las relaciones sexuales necesitan una perspectiva mucho más respetuosa.

Así como tener experiencias placenteras y seguras, sin sujeción, sin marginación, ni coerción. Los obstáculos vinculados con la salud sexual son extensos y algunas veces se ve condicionada por factores culturales, sociales y personales. (16)

Píldora oral de emergencia:

Se trata de comprimidos anticonceptivos destinados a prevenir embarazos no planificados o cuando ha ocurrido relaciones sexuales sin protección. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la ovulación y el aumento de la viscosidad del moco cervical, lo que dificulta el paso de los espermatozoides. Cabe destacar que no produce la interrupción de un embarazo en proceso. (17)

En que situaciones se debe usar:

Violación o coito forzado

Si no se utiliza ningún método anticonceptivo habitual.

Si se ha utilizado incorrectamente el método anticonceptivo: el condón se rompe, se desliza o se usó incorrectamente.

Ausencia consecutiva de dos o más anticonceptivos orales combinados o de inyecciones diferidas u otros métodos anticonceptivos habituales.

Abuso de método del calendario (menstruación), ciertos días o moco cervical.

Relaciones sexuales o eyaculación en la vagina o en el exterior de los genitales.

Expulsión del dispositivo intrauterino. (18)

Para quienes está dirigido:

Cualquier mujer en edad fértil que mantenga relaciones sexuales sin ninguna protección y no desee quedar en embarazo. Al igual que con otras píldoras anticonceptivas, las mujeres que ya están en embarazo no deben tomar este medicamento. Sin embargo, si una mujer lo utiliza sin saber que está gestando, la información disponible muestra que no dañará ni a la mujer, ni al producto. Ya que no afecta la implantación, no produce aborto, ni malformaciones en el producto. (17)

Composición:

Cada tableta contiene: Levonorgestrel0,75- 1,5 mg

Se puede tomar en dosis única de 1,5mg o en dos dosis de 0,75mg con un intervalo de 12 horas; junto con excipientes, hasta completar un comprimido. (19)

Contraindicaciones:

Presencia confirmada o sospecha de neoplasias malignas en la glándula mamaria.

Enfermedades hepáticas agudas, incluidas aquellas con tumores hepáticos benignos o malignos.

Sospecha o confirmación de embarazo.

Hipersensibilidad conocida progestinas.

Tromboflebitis o patología tromboembólica activa.

Hemorragias no diagnosticadas del tracto urinario. (20)

II. Estrategia metodológica.

2.1. Tipo de investigación:

El tipo de investigación es básica, prospectivo y de corte transversal.

Básica; Por que se orienta a la ampliación del conocimiento científico y filosófico, sin buscar una aplicación inmediata.

Prospectivo; Por que analiza datos recolectados en el presente con el propósito de estudiar eventos o comportamientos que se observarán en el futuro.

Corte transversal; porque implica la recopilación de información en un momento específico, a través de la observación de los fenómenos en un tiempo determinado.

2.2. Nivel de investigación:

Relacional; Este tipo de investigación tiene como objetivo determinar si existe una conexión o vínculo entre dos o más variables.

2.3. Diseño de investigación

Este trabajo emplea un diseño no experimental, porque no se manipulará el comportamiento de las variables, sino que se centrará en interpretar, para llegar a una conclusión.

2.4. Población

La población estará conformada por todas las estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga durante el año 2023, que son los siguientes:

Ciclo	Sección	N° de Estudiantes
II	A	22
II	B	21
VI	A	31
VIII	A	27
VIII	B	24
X	A	37
X	B	37
Total		199

2.5. Tamaño de la Muestra

La muestra estará conformada por estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga durante el año 2023.

La muestra será calculada mediante la fórmula para muestras finitas:

$$n = \frac{N * z^2 * P * Q}{d^2 * (N-1) + z^2 * P * q}$$

Donde:

Z = Nivel de confianza (según la tabla de valores de Z; en este caso Z=1.96)

p = Porcentaje de éxito

q = Porcentaje de fracaso

N = Tamaño de universo (Población) = 199

d = Error de estimación máximo aceptado

n = Tamaño de la muestra

n= 132 Estudiantes

2.6. Criterios de Inclusión

Estudiantes matriculadas en el II semestre de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga

Estudiantes que deseen participar en la investigación.

Estudiantes mayores de edad.

2.7. Criterios de exclusión

Estudiantes que no tengan disposición de participar en el estudio.

Estudiantes que posean alguna discapacidad que imposibilite participar en el estudio.

2.8. Técnicas de recolección de datos

La técnica empleada para la recolección de datos será de carácter observacional. Previo a la aplicación de las encuestas, se brindará a las estudiantes una explicación clara sobre los objetivos del estudio. Asimismo, se solicitará la firma del consentimiento informado, garantizando así su participación voluntaria y el respeto a los principios éticos de la investigación.

2.9. Instrumentos de recolección de datos

El instrumento será un cuestionario estructurado y validado por tres expertos entendidos en la materia. Este instrumento constará de cuatro aspectos relacionados a cada dimensión y variables; el primero referente a los datos socio-demográficos de las estudiantes, el segundo en relación a los factores personales, el tercero en relación a la conducta sexual y el cuarto en relación al consumo de la píldora de emergencia.

2.10. Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de datos

Luego de la recolección de la información se procederá a la revisión de cada encuesta para ver si todos los datos se encuentran llenados, para luego elaborar una base de datos en el programa SPSS versión 25 desde donde se obtendrán las tablas de frecuencia y de doble entrada para la realización de la estadística descriptiva y luego se realizará la contrastación de hipótesis para cumplir con la estadística inferencial.

III. RESULTADOS

Tabla 1: Prueba de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Estadístico	gl	Sig.
Factores predisponentes	,125	132	,000
uso del anticonceptivo emergencia	,332	132	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el grado significancia es menor de 0.05 lo cual muestra que los datos no siguen una distribución normal en base a esto se utilizara pruebas no paramétricas.

Estadística descriptiva

Factores sociodemográficos

Tabla 2 :Edad de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

		Edad			
		hi	Hi	fi	Fi
Válido	Menor de 19 años	11	8,3	8,3	8,3
	Entre 19 a 23 años	80	60,6	60,6	68,9
	24 a más años	41	31,1	31,1	100,0
	Total	132	100,0	100,0	

Fuente: Base de datos propia (SPSS)

Tabla N°02 y Figura N°01: Se observa que las edades que más predominio fueron entre 19 a 23 años con un porcentaje de 60.6%, seguidamente del grupo comprendido de los que tienen 24 a más años con un 31.1% y tan solo 8.3 % fue menor a 19 años de los estudiantes de obstetricia.

Figura 1: Edades de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.




Tabla 3: Estado civil de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

		Estado civil			
		hi	Hi	fi	Fi
Válido	Soltera	108	81,8	81,8	81,8
	Casada	6	4,5	4,5	86,4
	Conviviente	18	13,6	13,6	100,0
	Total	132	100,0	100,0	

Fuente: Base de datos propia (SPSS)

Tabla N°03 y Figura N°02: Se visualiza que según el estado civil de los estudiantes que predominó con un mayor porcentaje fue soltero con un porcentaje de 81.8%, mientras los que son convivientes es un 13.6% y tan solo 4.5% de las estudiantes son casadas.

Figura 2: Estado Civil de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.




Tabla 4 : Ciclo actual que están cursando los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

Ciclo actual que están cursando

		hi	Hi	fi	Fi
Válido	I ciclo - III ciclo	38	28,8	28,8	28,8
	IV ciclo - VI ciclo	50	37,9	37,9	66,7
	VII ciclo - IX ciclo	28	21,2	21,2	87,9
	X ciclo	16	12,1	12,1	100,0
	Total	132	100,0	100,0	

Fuente: Base de datos propia (SPSS)

Tabla N°04 y Figura N°03: Se observa que el ciclo de los estudiantes que más predominó es de IV ciclo a VI ciclo con un porcentaje de 37.9%, seguidamente del ciclo I a III con un 28.8%, luego el VIII a IX ciclo con un 21.2% y tan solo el X ciclo fue 12.1%.

Figura 3 :Ciclo actual que están cursando los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.




Tabla 5: Ocupación de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

		ocupación aparte de estudiar			
		hi	Hi	fi	Fi
Válido	Estudiante	103	78,0	78,0	78,0
	Con trabajo independiente	12	9,1	9,1	87,1
	Con trabajo dependiente	17	12,9	12,9	100,0
	Total	132	100,0	100,0	

Fuente: Base de datos propia (SPSS)

Tabla N°05 y Figura N°04: Se observa que la ocupación de los estudiantes que más preponderancia obtuvo fue de estudiante con un porcentaje de 78%, seguidamente de los que tienen trabajo dependiente con el 12.9% y tan solo 9.1 % con trabajo independiente.

Figura 4: Ocupación de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.





Tabla 6: Religión de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Católica	97	73,5	73,5	73,5
	Evangélica	33	25,0	25,0	98,5
	Atea	2	1,5	1,5	100,0
	Total	132	100,0	100,0	

Fuente: Base de datos propia (SPSS)

Tabla N°06 Y Figura N°05: Se observa la religión que los estudiantes pertenecen es a la religión católica con un porcentaje de 73.5%, seguido de evangélica con el 25% y atea con el 1.5%.

Figura 5: Religión de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga,2023.



Factores personales

Tabla 7 :Inseguridad en la relación con su pareja de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

		hi	Hi	fi	Fi
Válido	Si	37	28,0	28,0	28,0
	No	95	72,0	72,0	100,0
	Total	132	100,0	100,0	

Fuente: Base de datos propia (SPSS)

Tabla N°07 y Figura N°06: Se observa que existe un mayor porcentaje de los estudiantes que tienen seguridad en su pareja en un 28%, mientras los que tienen inseguridad es un total de 72%.

Figura 6 : Inseguridad en la relación con su pareja de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.




Tabla 8 : ¿Te sientes preparada para enfrentar este tipo de responsabilidad (embarazo)?

		fi	Fi	hi	Hi
Válido	Si	84	63,6	63,6	63,6
	No	48	36,4	36,4	100,0
	Total	132	100,0	100,0	

Fuente: Base de datos propia (SPSS)

Tabla N°08 y Figura N°07: Se observa que los estudiantes sí se sienten preparada para enfrentar la responsabilidad de un embarazo con un 63.6%, y tan solo el 36.4% no sienten preparadas para enfrentar esta responsabilidad.

Figura 7 : ¿Te sientes preparada para enfrentar este tipo de responsabilidad (embarazo)?





Tabla 9 : ¿Tienes temor de utilizar algún método anticonceptivo?

		hi	Hi	fi	Fi
Válido	Si	37	28,0	28,0	28,0
	No	95	72,0	72,0	100,0
	Total	132	100,0	100,0	

Fuente: Base de datos propia (SPSS)

Tabla N°11 y Figura N°8: Se Observa que los estudiantes no tienen temor a utilizar algún método anticonceptivo debido a sus conocimientos adquiridos en las clases es de 72%, mientras las que tienen temor solo es un 28%.

Figura 8: ¿Tienes temor de utilizar algún método anticonceptivo?



Conducta sexual

Tabla 10: Edad de inicio sobre las relaciones sexuales de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

		fi	Fi	hi	Hi
Válido	Menor de 15 años	8	6,1	6,1	6,1
	16 a 18 años	15	11,4	11,4	17,4
	19 a 24 años	102	77,3	77,3	94,7
	≥ 25 años	7	5,3	5,3	100,0
	Total	132	100,0	100,0	

Fuente: Base de datos propia (SPSS)

Tabla N°10 Y Figura N° 9: Se visualiza que la edad en la que los estudiantes iniciaron sus relaciones sexuales fue de 19 a 24 años con un porcentaje de 77.3%, seguidamente de un intervalo de edades de 16 a 18 años con el 11.4%, el 6.1% fue de menores de 15 años y por último con un porcentaje menor de 5.3% mayores de 25 años.

Figura 9: Edad de inicio sobre las relaciones sexuales de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.




Tabla 11: Utilización de un método anticonceptivo de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

		fi	Fi	hi	Hi
Válido	SI	99	75,0	75,0	75,0
	NO	33	25,0	25,0	100,0
	Total	132	100,0	100,0	

Fuente: Base de datos propia (SPSS)

Tabla N°11 y Figura N°10: Se visualiza que los estudiantes de obstetricia si utilizan algún método anticonceptivo por conocimiento es de un porcentaje de 75%, mientras los que no utilizan es un 25%.

Figura 10: Utilización de un método anticonceptivo de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.




Tabla 12: Relaciones sexuales sin protección de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

		fi	Fi	hi	Hi
Válido	Si	73	55,3	55,3	55,3
	No	59	44,7	44,7	100,0
	Total	132	100,0	100,0	

Fuente: Base de datos propia (SPSS)

Tabla N°12 Y Figura N°11: Se observa que los estudiantes tuvieron relaciones sin protección con el 55.3%, mientras que las que no tuvieron relaciones sexuales con protección es de un 44.7%.

Figura 11: Relaciones sexuales sin protección de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.




Tabla 13: Frecuencia de relaciones sexuales de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

		fi	Fi	hi	Hi
Válido	Semanal	59	44,7	44,7	44,7
	Cada 15 días	15	11,4	11,4	56,1
	Cada mes	18	13,6	13,6	69,7
	Mayor a 1 mes	40	30,3	30,3	100,0
	Total	132	100,0	100,0	

Fuente: Base de datos propia (SPSS)

Tabla N°13 Y Figura N°12: En la frecuencia de relaciones sexuales de los estudiantes se observa que con un mayor predominio de frecuencia de relaciones sexuales es semanal con el 44.7 %, seguido con que mantienen relaciones sexuales mayor a 1 mes con un 30.3%, las que tienen cada mes con el 13.6%, mientras que cada 15 días con el 11.4%.

Figura 12: Frecuencia de relaciones sexuales de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.




Tabla 14: Parejas sexuales de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad San Luis Gonzaga, 2023.

		fi	Fi	hi	Hi
Válido	1	90	68,2	68,2	68,2
	2 a 3	32	24,2	24,2	92,4
	Mayor de 3	10	7,6	7,6	100,0
	Total	132	100,0	100,0	

Fuente: Base de datos propia (SPSS)

Tabla N°14 y Figura N°13: Según las parejas de los estudiantes se visualiza a continuación que el mayor porcentaje de las parejas sexuales que han tenido las estudiantes es de 1 con un 68.2%, seguido de entre 2 a 3 con el 24.2%, y tan solo 7.6% es mayor a 3 parejas.

Figura 13 : Parejas sexuales de los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.





Tabla 15: Uso del anticonceptivo de emergencia en los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

		FRECUENCIA DE USO			
		fi	Fi	hi	Hi
Válido	1 vez al año	20	15,2	15,2	15,2
	2 a 3 veces al año	6	4,5	4,5	19,7
	4 a 5 veces al año	31	23,5	23,5	43,2
	Después de cada relación sexual	75	56,8	56,8	100,0
Total		132	100,0	100,0	

Fuente: Base de datos propia (SPSS)

Tabla N° 15 y Figura N° 14: Sobre el uso del anticonceptivo en los estudiantes se observa que el uso sobre el anticonceptivo de emergencia fue 56,8% es después de cada relación sexual, seguidamente 23.5% es de 4 a 5 veces al año, y el 15.2 refiere a ver utilizado 1 vez al año y tan solo 4.5% es de 2 a 3 veces al año.

Figura 14: Uso del anticonceptivo de emergencia en los estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.



Estadística Inferencial

Comprobación de hipótesis general:

Ha: Existe relación entre Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.


H0: No existe relación entre Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

Tabla 16: Relación entre Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia			Factores predisponentes	uso del anticonceptivo emergencia
Rho de Spearman	Factores predisponentes	Coefficiente de correlación	1,000	-,080
		Sig. (bilateral)	.	,361
		N	132	132
	uso del anticonceptivo emergencia	Coefficiente de correlación	-,080	1,000
		Sig. (bilateral)	,361	.
		N	132	132

Elaboración propia (SPSS v. 25)

Figura 15: Relación entre Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.



Elaboración propia (SPSS v. 25)

Interpretación: Tabla N°16 y figura N°15 muestra que el grado significancia bilateral es de ,361 y el coeficiente de correlación tiene un valor de -,080, basándonos a estos resultados no existe una correlación significativa entre ambas variables por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula.

Comprobación de hipótesis E1:

Ha: Existe relación entre los Factores socio- demográficos y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

H0: No existe relación entre los Factores socio- demográficos y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

Tabla 17: Relación entre los Factores socio- demográficos y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.


Factores sociodemográficos y uso del anticonceptivo de emergencia

		Factores sociodemográficos	uso del anticonceptivo o emergencia
Rho de Spearman sociodemograficos	Coeficiente de correlación	1,000	-,287**
	Sig. (bilateral)	.	,001
	N	132	132
uso del anticonceptivo emergencia	Coeficiente de correlación	-,287**	1,000
	Sig. (bilateral)	,001	.
	N	132	132

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Elaboración propia (SPSS v. 25)

Figura 16: Relación entre los Factores socio- demográficos y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.



Elaboración propia (SPSS v. 25)

Interpretación: Tabla N° 17 y figura N° 16 muestra que el grado significancia bilateral es de ,001 y el coeficiente de correlación tiene un valor de -,287, basándonos a estos resultados existe una correlación significativa entre ambas variables por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.

Comprobación de hipótesis E2:

Ha: Existe relación entre los Factores personales y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.


H0: No existe relación entre los Factores personales y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

Tabla 18: Relación entre los Factores personales y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

		Factores personales		uso del anticonceptivo emergencia
Rho de Spearman	Factores personales	Coefficiente de correlación	de1,000	-,168
		Sig. (bilateral)	.	,054
		N	132	132
uso del anticonceptivo emergencia	del	Coefficiente de correlación	de-,168	1,000
		Sig. (bilateral)	,054	.
		N	132	132

Elaboración propia (SPSS v. 25)

Figura 17 :Relación entre los Factores personales y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.



Elaboración propia (SPSS v. 25)

Interpretación: Tabla N°18 y figura N°17 muestra que el grado significancia bilateral es de ,054 y el coeficiente de correlación tiene un valor de -,168, basándonos a estos resultados no existe una correlación significativa entre ambas variables por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula.

Comprobación de hipótesis E3:

Ha: Existe relación entre la Conducta Sexual y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

H0: No existe relación entre la Conducta Sexual y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

Tabla 19: Relación entre la conducta sexual y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.


Relación entre la conducta sexual y uso del anticonceptivo de emergencia

		Conducta sexual	uso del anticonceptivo emergencia
Rho de Spearman	Conducta sexual	Coefficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	,313**
	N		,000
uso del anticonceptivo emergencia		N	132
		Coefficiente de correlación	,313**
		Sig. (bilateral)	1,000
	N		,000
		N	132

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Elaboración propia (SPSS v. 25)

Figura 18: Relación entre la conducta sexual y uso del anticonceptivo de emergencia.



Elaboración propia (SPSS v. 25)

Interpretación: Tabla N°19 y figura N° 18 muestra que el grado significancia bilateral es de ,000 y el coeficiente de correlación tiene un valor de ,313, basándonos a estos resultados existe una correlación significativa entre ambas variables por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.

IV. DISCUSIÓN

En la presente investigación se determinó que no existe una relación entre los Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023, con un grado de significancia bilateral (.361) y el coeficiente de correlación tiene un valor de (-,080).

Respecto al segundo objetivo planteado se identificó que existe una relación entre los Factores sociodemográficos y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023, ya que el grado de significancia bilateral fue de ,001 y el coeficiente de correlación tiene un valor de -,287. Dentro de los factores sociodemográficos de los estudiantes de Obstetricia, el grupo etario predominante fue de 19 a 23 años, representando el 60.6 % del total. Asimismo, el 81.8% de los participantes se encontraba en condición de soltería y el 37.9% cursaba entre el cuarto y sexto ciclo académico. En cuanto a la ocupación, el 78% eran estudiantes a tiempo completo. Respecto al uso de anticoncepción oral de emergencia, se observó que el 56.8% de las participantes la empleaban tras cada relación sexual. Estos resultados se pueden contrastar con los hallazgos de otros estudios. Por ejemplo, Tenaw L. (6) reportó que el 48.1% de las usuarias tenían entre 20 y 24 años; 79.1% residía en zonas urbanas, el 87.9% pertenecía a la religión ortodoxa, el 64.7% era soltera, y el 34% contaba con estudios secundarios. De manera similar, Yeboah D, Appiah M y Kampitib G. (7) encontraron que el 48.08% de las participantes eran mayor de 25 años, el 85.58% se identificaba como cristiana, el 38.14% poseía formación universitaria, y el 65.71% era soltera. Por su parte, Rodas J. y Rojas M. (9), señalaron que el grupo de edad más frecuente fue de 17 a 21 años (74.7%), predominando el sexo femenino (79.5%) y el estado civil soltera (94.0%).

Se determinó que no existe relación entre los Factores personales y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023, con un grado de significancia bilateral de,054 y el coeficiente de correlación tiene un valor de -,168. Se evidenció que el 72% manifestó no experimentar inseguridad en su relación de pareja.

Además, el 63.3% indicó sentirse preparado para asumir diversas responsabilidades, y un 72% declaró no sentir temor al utilizar algún método anticonceptivo. En lo que respecta a la afiliación religiosa, el 73.5% se identificó con la religión católica. Estos hallazgos pueden compararse con los resultados de otras investigaciones Pedraza M. (8) señaló que el 86.6% de los participantes tenía una vida sexual activa, y el 85.1% había recurrido a la anticoncepción de emergencia, siendo el levonorgestrel (conocido como la píldora del día siguiente) el método más utilizado en un 98.6%. Además, se encontró que el 55.8% recibió la recomendación de uso por parte de un familiar. Por otro lado, Olivares S. (13), informó que el 55.21% de las encuestadas utilizó la anticoncepción oral de emergencia de forma inadecuada y que variables como la satisfacción con

la vida y la comunicación con los padres no mostraron asociación significativa con dicho uso. De manera similar, Quispe A. (12) halló que el 20.8% de las participantes había tenido relaciones sexuales una sola vez, el 29.2% reportó haber tenido una única pareja sexual y uso la píldora de emergencia en una sola ocasión. Asimismo, el 28.3% tenía algún nivel de información sobre ese método, y el 22.6% indicó haber tenido relaciones sexuales sin protección.

Existe relación entre las conductas sexuales y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023. Con el grado de significancia bilateral de, 0.000 y el coeficiente de correlación tiene un valor de, 0.313. Se encontró que las estudiantes de Obstetricia iniciaron relaciones sexuales entre 19 a 24 años de edad con el 77.3%, seguido que han utilizado algún método anticonceptivo con el 75%, tuvieron relaciones sin protección con el 55.3%, la frecuencia de relaciones sexuales fueron semanal con el 44.7%, y la cantidad de parejas sexuales fue de 1, con el 68.2% relacionado con el uso del anticonceptivo oral de emergencia (AOE) después de cada relación sexual con el 56.8% a comparación de Pillajo F. (10), la edad de la primera relación sexual fue entre 13 a 18 años, el 40.48% tuvieron dos parejas sexuales, 30.9% respondió que tenían buena relación familiar, 54.76% no consume alcohol, 69.05% manifestó que la píldora es muy accesible, la orientación que recibió fue de una amiga en el 34.38%, del mismo modo Ramírez N. (14), refirió que el 59.1% refiere utilizar las píldoras para evitar el embarazo no planificado, 27.3% por ser adolescentes, 9.1% refirió que lo usó por violación sexual. De las alumnas que los usaron manifestaron que el 34.1% fue por recomendación de una amiga, 27.3% porque vio en internet y 13.6% por recomendación de la pareja, así mismo Horna C. (15), la conducta sexual, las relaciones sexuales no planificadas $p=0.000$, precio al alcance de la adolescente $p=0.000$, disponibilidad en las farmacias $p=0.008$. No hay relación entre el uso del Levonorgestrel y el conocimiento del mecanismo de acción $p=0.326$ o el tiempo del efecto del anticonceptivo $p=0.310$. Los adolescentes iniciaron su vida sexual en el 50.76% de ellos.

V. CONCLUSIONES

En relación con el objetivo general del estudio, se logró determinar que no existe una relación entre los Factores predisponentes y el uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023. De acuerdo con los resultados del análisis estadístico mediante la prueba de Rho de Spearman, se obtuvo un valor del grado de significancia bilateral ,361 el cual es mayor al nivel de significancia establecido ($\alpha= 0.05$), y el coeficiente de correlación tiene un valor de -,080, lo que indica una relación inversa nula entre ambas variables.

Se concluyó en relación a los Factores sociodemográficos de las estudiantes, fueron la edad entre 19 a 23 años 60,6%, con estado civil solteras 81,8%, el ciclo actual que están cursando IV – VI 37,9%, con ocupación estudiante 78,0% y pertenecen a la religión católica 73,5%, según Rho Spearman, el grado significancia bilateral es de ,001, lo que confirma que existe una relación entre los factores sociodemográficos y el uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023. El coeficiente de correlación es de -,287, lo que indica que los factores sociodemográficos influyen de manera inversa sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia.

En relación con los Factores personales, se identificó que no existe asociación significativa con el uso de anticonceptivo de emergencia. Los datos revelan que el 72,0% de los participantes no reportan inseguridad en su relación de pareja, el 63,3% se consideran preparadas para asumir diversas responsabilidades, y el 72,0% no presentan temor al utilizar algún método anticonceptivo. El análisis estadístico, arrojó un valor de $p= (.054)$, lo que permite concluir que no existe una relación estadísticamente significativa entre los factores personales y el uso del anticonceptivo oral de emergencia. Y el Rho Spearman (-,168) lo que indica que ejerce una débil influencia los factores personales sobre el uso de anticonceptivo de emergencia.

En relación a los Factores relacionados a la conducta sexual existe relación al uso de la píldora del día siguiente fueron, iniciaron relaciones sexuales entre los 19 a 24 años 77,3%, han utilizado método anticonceptivo 75,0%, tuvieron relaciones sexuales sin protección 55,3%, frecuentemente tienen relación sexual semanalmente 44,7%, y han tenido 1 pareja sexual 68,2%. Según Rho Spearman tiene un valor de P de ,000 y el coeficiente de correlación tiene un valor de ,313, basándonos a estos resultados existe una correlación significativa y positiva entre ambas variables.

VI. RECOMENDACIONES

Implementar campañas educativas dirigidas a los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, con el fin de brindar información clara sobre el uso adecuado de la anticoncepción oral de emergencia, enfatizando que su uso debe limitarse a situaciones excepcionales y no reemplazar los métodos anticonceptivos de uso regular.

Establecer estrategias orientadas a mejorar la comprensión de las mujeres en edad reproductiva respecto al uso correcto y al acceso oportuno a la píldora del día después, abordando además mitos y percepciones erróneas comúnmente asociadas a ese método.

Fomentar la difusión de información verificada y accesible sobre la anticoncepción de emergencia, con el propósito de prevenir efectos adversos en la salud de las usuarias y promover una toma de decisiones informada y responsable.

El centro médico de la universidad debe contar con profesionales especializados (obstetras) para la difusión y distribución de insumos de planificación familiar al alcance de la población estudiantil.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. Ministerio de Salud. Planificación Familiar. [Online].; 2022 [cited 2023 agosto 8. Available from: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4191.pdf>.
2. Organización Mundial de la Salud (OMS). Embarazo adolescente. [Online].; 2019 [cited 2023 agosto 12. Available from: [: https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/adolescent-pregnancy](https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/adolescent-pregnancy).
3. Ministerio de Salud. Métodos Anticonceptivos. [Online].; 2022 [cited 2023 agosto 14. Available from: [: https://www.gob.pe/21781-metodos-anticonceptivos](https://www.gob.pe/21781-metodos-anticonceptivos).
4. Organización Mundial de la Salud. Anticoncepción de Urgencia. [Online].; 2021 [cited 2023 agosto 10. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/emergency-contraception>.
5. Encuesta Demografica y de Salud Familiar. [Online].; 2017 [cited 2020 diciembre 21. Available from: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1525/index.html.
6. Tenaw L. Practice and determinants of emergency contraceptive utilization among women seeking termination of pregnancy in Northwest Ethiopia-A mixed quantitative and qualitative study. PLoS One. 2022 Feb; 17(2).
7. Yeboah D, Appiah M, Kampitib G. Factors influencing the use of emergency contraceptives among reproductive age women in the Kwadaso Municipality, Ghana. Plos One. 2022 mar; 17(3).
8. Pedraza M. Uso y frecuencia de anticonceptivos de emergencia en población perteneciente a una universidad privada de Bogotá, Colombia. [Online].; 2020 [cited 2023 agosto 8. Available from: <https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/3934/USO%20Y%20FRECUENCIA%20ANTICONCEPTIVOS%20DE%20EMERGENCIAS%20%20042021.pdf?sequence>.
9. Rodas J, Rojas M. Conocimientos y uso de la anticoncepción oral de emergencia en estudiantes de enfermería de la Universidad de Cuenca, Ecuador. [Online].; 2019 [cited 2023 agosto 8. Available from: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32785/1/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACION%2093N.pdf>.

10. Pillajo F. Factores asociados al uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia en pacientes que acuden al centro de Salud Anidados Otavalo [Tesis de pregrado] , editor. Ecuador: Universidad Técnica del Norte; 2019.
11. Quispe Huamani E CW. Estudio sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia en mujeres 15 a 30 años de edad en Santa Clara - Ate-Lima 2021. Universidad Roosevelt. [tesis de pregrado]. [Online].; 2022 [cited 2023 julio 20. Available from: <https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/1007/TESIS%20QUISP%20-%20CHURAMPI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
12. Quispe Davila E. Factores relacionados al uso de la píldora del día siguiente en adolescentes de la Institución Educativa Santa Rosa Puno, 2021 [Tesis de pregrado] , editor. Puno: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez; 2022.
13. Olivares S. Factores asociados al uso inadecuado de los anticonceptivos orales de emergencia en estudiantes universitarios, Piura 2021-2022. [Online].; 2022 [cited 2023 setiembre 30. Available from: <https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/9746>.
14. Ramírez N, Redolfo R. Factores asociados al uso de la Anticoncepción oral de Emergencia en las estudiantes adolescentes del 5to año de secundaria del colegio Mariscal Cáceres de Ayacucho setiembre-diciembre del 2019 [Tesis de pregrado] , editor. Ayacucho: Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga; 2020.
15. Horna C. Factores que influyen en el consumo de Levonorgestrel como método anticonceptivo de emergencia en adolescentes. [Online].; 2019 [cited 2023 setiembre 30. Available from: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPAO_15e8b17a592db455d6675d4c8bafa62d.
16. OMS. Salud Sexual. [Online].; 2021 [cited 2024 junio 17. Available from: https://www.who.int/es/health-topics/sexual-health#tab=tab_1.
17. MINSA. [Online].; 2020 [cited 2024 Junio 17. Available from: https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/final02julioanticonceptivo_oral_de_emergencia_20200702.pdf.
18. Medline plus. [Online].; 2024 [cited 2024 Junio 17. Available from: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007014.htm>.
19. CIMA. [Online].; 2021 [cited 2024 Junio 17. Available from: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/79217/Prospecto_79217.html.
20. OMS. [Online].; 2016 [cited 2024 Junio 17. Available from: <https://promsex.org/oms-nota-descriptiva-n-244-anticoncepcion-de-emergencia/>.

VIII. ANEXOS

8.1. Instrumentos de recolección de información.



CUESTINARIO
**Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de
emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga, 2023.**



ASPECTOS GENERALES

1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS

¿Qué edad tienes?

- a. Menor de 19 años
- b. Entre 19 a 23 años
- c. 24 a más años

¿Cuál es tu estado civil?

- a. Soltera
- b. Casada
- c. Conviviente

¿Qué ciclo que estás cursando actualmente?

- a. I ciclo - III ciclo
- b. IV ciclo - VI ciclo
- c. VII ciclo - IX ciclo
- d. X ciclo

¿Cuál es tu ocupación?

- a. Estudiante
- b. Con trabajo independiente
- c. Con trabajo dependiente

¿A qué religión perteneces?

- Católica _____
- Evangélica _____
- Atea _____

2. FACTORES PERSONALES

¿Tienes inseguridad en la relación con tu pareja?

- Si _____
- No _____

¿Te sientes preparada para enfrentar este tipo de responsabilidad?

- Si _____
- No _____

¿Tienes temor de utilizar algún método anticonceptivo?

- Si _____
- No _____

3. CONDUCTA SEXUAL

¿A qué edad iniciaste tus relaciones sexuales?

- Menor de 15 años _____
- 16 a 18 años _____
- 19 a 24 años _____
- ≥ 25 años _____

¿Has utilizado algún método anticonceptivo: Si _____ No _____

¿Tuviste relaciones sexuales sin protección? Sí _____ No _____

¿Cuál es la frecuencia de tus relaciones sexuales?

- Semanal _____
- Cada 15 días _____
- Cada mes _____
- Mayor a 1 mes _____

¿Cuántas parejas sexuales has tenido?

- 1 _____
- 2 a 3 _____
- Mayor a 3 _____

4. UTILIZACIÓN DE LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE

Frecuencia de utilización

- a. 1 vez al año
- b. 2 a 3 veces al año
- c. 4 a 5 veces al año
- d. Después de cada relación sexual

8.2. Consentimiento informado.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo.....identificado con N° de DNI....., que habiendo recibido toda la información verbal y escrita para participar en el proyecto de investigación, tomando en cuenta la naturaleza del estudio, los objetivos y el propósito en que está orientado, autorizo se realice la encuesta y que se tome toda la información necesaria para la ejecución del Proyecto de investigación **Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023**

Firma de la encuestada

8.3. Matriz de consistencia

Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables	Dimensiones	Indicadores	Nivel de medición	Metodología
<p>Problema General: ¿Cuál es la relación entre los Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023?</p> <p>Problemas específicos: PE1. ¿Cuál es la relación entre los Factores demográficos y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de</p>	<p>Objetivo General: Determinar la relación entre los Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.</p> <p>Objetivos específicos: OE1. Determinar la relación entre los Factores socio-demográficos y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la</p>	<p>Hipótesis general: Existe relación entre Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.</p> <p>Hipótesis Específica: HE1. Existe relación entre los Factores socio-demográficos y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la</p>	<p>V. Dependiente: Anticonceptivo de emergencia</p>	Utilización	Frecuencia de utilización	1 vez al año 2 a 3 veces al año 4 a 5 veces al año Después de cada relación sexual	<p>Tipo de investigación Básica, prospectivo y de corte transversal.</p> <p>Nivel de investigación Relacional</p> <p>Diseño de investigación No experimental</p> <p>Población La población estará conformada por todas las estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga durante el II semestre del año 2023.</p> <p>N:199 Estudiantes</p>
			<p>V. Independiente: Factores predisponentes</p>	Factores socio-demográficos	<p>Edad</p> <p>Estado civil</p> <p>Ciclo que cursa</p> <p>Ocupación</p>	<p>Menor de 19 años De 19 a 23 años 24 a más años</p> <p>Soltera Casada Conviviente</p> <p>I a II ciclo III a IV ciclo V a VI ciclo VII a VIII ciclo</p> <p>Sólo estudiante Con trabajo dependiente Con trabajo independiente</p>	

8.4. Base de datos

Vista de Variables

*spss fatima data.sav [ConjuntoDatos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

	Nombre	Tipo	Anchura	Decimales	Etiqueta	Valores	Perdidos	Columnas	Alineación	Medida	Rol
1	Edad_1	Numérico	8	0	EDAD	{1, Menor d...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
2	Esta_c1	Numérico	8	0	ESTADO CIVIL	{1, Soltera}...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
3	ciclo	Numérico	8	0	CICLO ACTUA...	{1, 1 ciclo - II...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
4	OCUP	Numérico	8	0	OCUPACION A...	{1, Estudian...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
5	FAC	Numérico	8	0	¿Tienes insegu...	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
6	pre_1	Numérico	8	0	¿Te sientes pre...	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
7	met_1	Numérico	8	0	¿Tienes temor ...	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
8	reli_2	Numérico	8	0	¿A qué religión ...	{1, Católica}...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
9	facperso	Numérico	8	0	¿A qué edad ini...	{1, Menor d...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
10	met_2	Numérico	8	0	¿Has utilizado ...	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
11	rela_1	Numérico	8	0	¿Tuviste relacio...	{1, Si}...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
12	frec_1	Numérico	8	0	¿Cuál es la frec...	{1, Semanal...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
13	pare_2	Numérico	8	0	¿Cuántas parej...	{1, 1}...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
14	canti_2	Numérico	8	0	Cantidad de util...	{1, 1 vez al ...	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada

Vista de Datos

*spss fatima data.sav [ConjuntoDatos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Visible:

	Edad_1	Esta_c1	ciclo	OCUP	FAC	pre_1	met_1	reli_2	facperso	met_2	rela_1	frec_1	pare_2	canti_2
1	1	1	1	1	2	1	2	1	3	2	1	1	1	4
2	1	1	1	1	2	1	2	1	3	2	1	1	1	4
3	1	1	1	1	2	1	2	1	3	2	1	1	1	4
4	1	1	1	1	2	1	2	1	3	2	1	1	1	4
5	1	1	1	1	2	1	2	1	3	2	1	1	1	4
6	1	1	1	1	2	1	2	1	3	2	1	1	1	4
7	1	1	1	1	2	1	2	1	3	2	1	1	1	4
8	1	1	1	1	2	1	2	1	3	2	1	1	1	4
9	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	4
10	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	4
11	2	1	1	1	2	1	2	1	3	1	1	3	1	4
12	2	1	1	1	2	1	2	1	3	1	1	3	1	4
13	2	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	3	1	4
14	2	1	1	1	1	1	2	1	3	2	1	3	1	4
15	2	1	1	1	2	1	2	1	3	2	1	3	1	4
16	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1	1	3	1	4
17	2	1	1	1	1	2	1	1	3	2	1	3	1	4
18	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1	1	3	1	4
19	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1	1	3	1	4
20	2	1	1	1	2	2	1	1	3	2	1	3	1	4
21	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	3	1	3
22	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	3	1	3

23	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	1	3
24	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	3	1	3
25	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	2	3	1	3
26	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	3	1	3
27	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1	3	1	3
28	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	3	1	3
29	2	1	2	1	2	2	2	1	3	2	1	1	1	3
30	2	1	2	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	3
31	2	1	2	1	2	2	2	1	3	1	2	1	1	3
32	2	1	2	1	2	2	2	1	3	1	1	1	1	3
33	2	1	2	2	2	1	2	1	3	1	2	1	1	3
34	2	1	2	2	1	1	1	1	3	2	1	1	1	3
35	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	3
36	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	3
37	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	4	1	3
38	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	3
39	2	1	2	3	2	1	2	1	4	1	2	4	1	3
40	2	1	2	3	2	1	2	1	4	1	1	4	1	3
41	2	1	2	3	2	1	2	2	4	1	2	4	1	3
42	2	1	2	3	2	1	2	2	2	1	1	4	1	3
43	2	1	2	3	1	2	2	2	2	1	2	4	1	4
44	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	4	1	4
45	2	1	2	3	2	2	2	2	2	3	2	4	1	4
46	2	1	2	3	2	2	2	2	3	2	1	4	1	4
47	2	1	2	3	2	2	2	1	3	2	1	4	1	4
48	2	1	2	3	1	2	2	1	3	2	1	2	1	4
49	2	1	2	2	2	2	2	1	3	2	1	2	1	4
50	2	1	2	2	1	2	2	1	3	2	1	2	1	4
51	2	1	2	2	2	1	2	1	3	1	1	2	1	4
52	2	1	2	1	2	1	2	1	3	1	1	2	1	4
53	2	1	2	1	1	1	2	1	3	1	1	2	1	3
54	2	1	2	1	2	1	2	1	3	1	1	2	1	3
55	2	1	3	1	2	1	2	1	3	1	1	1	1	3
56	2	1	3	1	2	1	2	1	3	1	1	1	1	3
57	2	1	3	3	2	1	2	1	3	1	1	1	1	3
58	2	1	3	3	2	1	2	1	3	1	1	1	1	3
59	2	1	3	3	2	1	2	1	3	1	2	1	1	3
60	2	1	3	3	2	1	1	1	3	1	2	1	1	3
61	2	1	3	2	2	2	1	2	3	1	2	1	1	3
62	2	1	3	2	2	2	1	2	3	1	2	1	1	1
63	2	1	3	2	2	2	2	2	3	1	2	1	1	1
64	2	1	3	2	2	2	2	2	3	1	2	1	1	1
65	2	1	3	2	2	2	2	2	3	1	2	2	1	1
66	2	1	4	3	1	2	2	1	3	1	2	2	1	1
67	2	1	4	3	2	2	2	1	3	1	2	2	1	1
68	2	1	4	3	2	2	2	1	3	1	2	2	1	1
69	2	1	4	1	2	1	2	1	3	1	2	2	1	1
70	2	1	4	1	2	1	2	1	3	1	2	2	1	4
71	2	1	4	1	2	1	2	1	3	1	2	2	1	4
72	2	1	4	1	2	1	2	1	3	1	2	2	1	4
73	2	1	4	1	2	1	2	1	3	1	2	1	1	4
74	2	1	4	1	2	1	2	1	3	1	2	1	1	4
75	2	1	4	1	2	1	2	1	3	1	2	1	1	4
76	2	1	4	1	2	1	2	2	3	1	2	1	1	4
77	2	1	4	1	2	1	1	2	3	1	2	1	1	4
78	2	1	4	1	1	1	1	2	3	1	2	1	1	4
79	2	1	4	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	4
80	2	1	4	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1
81	2	1	4	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1
82	2	1	2	1	2	2	1	2	3	1	1	1	1	1
83	2	1	2	1	1	2	1	2	3	1	1	4	1	1
84	2	1	2	1	2	2	1	1	3	2	1	4	1	1
85	2	1	2	1	1	2	2	1	3	2	1	4	1	4
86	2	1	2	1	2	2	2	1	3	2	1	4	1	4
87	2	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	4	1	4
88	2	1	1	1	2	1	2	1	3	1	1	4	1	4
89	2	1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	4	1	4
90	2	1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	4	1	4
91	3	3	3	1	1	1	2	1	3	1	2	4	2	4
92	3	3	3	1	1	1	2	1	3	1	2	4	2	4
93	3	3	3	1	1	1	2	1	3	1	2	4	2	4
94	3	3	3	1	2	1	2	2	3	1	2	4	2	4
95	3	3	3	1	2	1	1	2	3	1	2	4	2	2
96	3	3	3	1	1	1	1	2	3	1	2	4	2	2
97	3	3	3	1	1	1	1	2	3	1	1	4	2	2
98	3	3	3	1	2	1	2	2	3	1	1	4	2	2
99	3	3	2	1	2	1	2	1	3	1	1	1	2	1
100	3	3	2	1	2	1	2	1	3	1	1	1	2	1

101	3	3	2	1	1	1	2	1	3	1	1	1	3	1
102	3	3	2	1	2	1	2	1	3	1	1	1	3	1
103	3	3	1	1	2	1	2	1	3	1	1	1	3	1
104	3	3	1	1	2	1	2	1	3	1	1	1	3	1
105	3	3	1	1	2	1	2	1	3	1	1	1	3	1
106	3	3	2	1	2	1	2	1	3	1	1	1	3	4
107	3	3	2	1	2	1	2	1	3	1	2	1	3	4
108	3	3	2	1	2	1	1	1	3	1	2	1	3	4
109	3	2	1	1	2	1	1	2	3	1	2	4	3	4
110	3	2	1	1	2	1	1	1	3	1	2	4	3	4
111	3	2	1	1	2	1	1	1	3	1	2	4	2	4
112	3	2	3	1	1	1	1	1	3	1	2	4	2	4
113	3	2	3	1	1	1	2	3	3	1	2	4	2	4
114	3	2	3	1	1	1	2	1	3	1	2	1	2	4
115	3	1	3	1	1	1	2	1	3	1	2	1	2	4
116	3	1	3	1	2	2	2	1	3	1	2	1	2	2
117	3	1	3	1	2	2	2	1	3	1	2	1	2	2
118	3	1	2	1	2	2	2	1	3	1	2	1	2	4
119	3	1	2	1	2	2	2	1	3	1	2	1	2	4
120	3	1	2	1	2	2	2	1	3	1	1	1	2	4
121	3	1	2	1	2	2	2	1	3	1	1	1	2	4
122	3	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	4
123	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	4
124	3	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	4	2	4
125	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	4	2	4
126	3	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	4	2	4
127	3	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	4	2	4
128	3	1	2	1	2	1	1	3	2	1	1	4	2	4
129	3	1	2	1	2	1	1	2	4	1	1	4	2	4
130	3	1	3	1	2	1	1	2	4	1	2	4	2	4
131	1	1	3	1	1	1	1	2	4	1	2	4	2	4
132	3	1	3	1	2	1	1	2	4	1	2	4	2	4

8.5. Validación de expertos



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
 FACULTAD DE OBSTERICIA
 ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA
 ESCALA DE CALIFICACION
 PARA EL JUEZ EXPERTO



Estimado Juez experto (a): Dr. Miguel Ángel Hernández López

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta correspondiente al proyecto de investigación titulado:

Factores profesionales y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023.

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión

CRITERIOS	SI (1)	NO (0)	OBSERVACIONES
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación	X		
2.- La estructura del instrumento es adecuado	X		
3.- Los ítems del instrumento responde a la operacionalización de la variable	X		
4.- La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento	X		
5.- Los ítems son claros y entendibles	X		
6.- El número de ítems es adecuado para su aplicación	X		

SUGERENCIAS:

Dr. Miguel Ángel Hernández López
 OBSTETRA ESPECIALISTA
 C.O.P. 24922 RNE 558-E.02

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL JUEZ EXPERTO



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
FACULTAD DE OBSTETRICIA
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA
ESCALA DE CALIFICACION
PARA EL JUEZ EXPERTO



Estimado juez experto (a): Mag. Anabel Liduvina Gabriel Guevara

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta correspondiente al proyecto de investigación titulado:

Efectos psicológicos y uso del medicamento de emergencia
en estudiantes de obstetricia de la Universidad Nacional
San Luis Gonzaga, 2023

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión

CRITERIOS	SI (1)	NO (0)	OBSERVACIONES
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación	X		
2.- La estructura del instrumento es adecuado	X		
3.- Los ítems del instrumento responde a la operacionalización de la variable	X		
4.- La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento	X		
5.- Los ítems son claros y entendibles	X		
6.- El número de ítems es adecuado para su aplicación	X		

SUGERENCIAS:

.....

.....

.....

Ica, 24 de Setiembre del 2023

Guevara

DR. ANABEL A.L. GABRIEL GUEVARA
 SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE COMPLETO DEL JUEZ EXPERTO



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
FACULTAD DE OBSTERICIA
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA
ESCALA DE CALIFICACION
PARA EL JUEZ EXPERTO



Estimado juez experto (a): Mag. Ivonne Borda Cervero

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta correspondiente al proyecto de investigación titulado:

Factores Predictores y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de obstetricia de la universidad nacional San Luis Gonzaga, 2023

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión

CRITERIOS	SI (1)	NO (0)	OBSERVACIONES
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación	X		
2.- La estructura del instrumento es adecuado	X		
3.- Los ítems del instrumento responde a la operacionalización de la variable	X		
4.- La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento	X		
5.- Los ítems son claros y entendibles	X		
6.- El número de ítems es adecuado para su aplicación	X		

SUGERENCIAS:

.....

.....

.....

.....

Ica, 14 de Octubre del 2023


 Mag. Ivonne Borda Cervero
 OBSTETRICIA
 HOSPITAL "FELE TORREALBA GUERRERO"
 NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL JUEZ EXPERTO


8.6. Constancia de aprobación



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
FACULTAD DE OBSTETRICIA
DECANATO



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DECANAL N°017-2024-UNICA/F.Obs.-D-1

Ica, 19 de febrero de 2024

VISTO

Que, visto el Oficio N°007-2024-UNICA-Fac.Obs./C.I. de fecha 14 de febrero de 2024, emitido por el presidente del Comité de Investigación de la Facultad de Obstetricia; remite el Acta N°001-2024 de Aprobación del Proyecto de Tesis titulado **Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023**, presentado por la Bach. **FATIMA ZENAIDA AZURZA RAMOS**; en cumplimiento con los requisitos señalados en el Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" aprobado mediante Resolución Rectoral N°048-R-UNICA-2021, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Facultad de Obstetricia de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" es una Unidad Fundamental de Organización, cuya finalidad es la formación académica y profesional de los estudiantes.

Que, con Resolución Rectoral N°046-R-UNICA-2013, de fecha 15 de enero del 2013, se crea la **Facultad de Obstetricia de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga"**; de conformidad con el artículo 21° inciso r) del Estatuto Universitario y en concordancia con el Artículo 48° inciso b) del Reglamento General de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". Es necesario aclarar que el Programa de Estudios de Obstetricia se oferta desde la creación de la Facultad de Obstetricia, oficializada mediante Resolución Rectoral N° 046-R-UNICA-2013 del 15 de enero de 2013.

Que con Resolución Rectoral N°273-R-UNICA-2013, de fecha 04 de marzo de 2013, se **autoriza el funcionamiento. Entre otras Facultades. A la Facultad de Obstetricia de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga"**.

Que, mediante Resolución Rectoral N°014-R-UNICA-2024 de fecha 10 de enero del presente año; se Resuelve a encargar interinamente a la **Dra. ROSA ELVIRA RUIZ REYES** en el cargo de Decana de la Facultad de Obstetricia de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución Rectoral.

Que, de acuerdo al Art. 7º del Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", es obligatoria la presentación y sustentación de la tesis que debe ser original e inédito y supone además una sustentación pública ante la comunidad académica en general y la aprobación por un jurado, que lo evalúa. La fecha del acto público de sustentación debe ser lo suficientemente difundido para promover la transparencia y participación de la comunidad académica en general.

Que, de acuerdo al Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", en su Art. 28.- La tesis para el título profesional debe ser inédita y es de propiedad del autor. La tesis versará sobre temas de interés local, regional o nacional que aborden problemas de impacto social o académico que tenga pertinencia con el perfil profesional y que estén relacionados con las líneas de investigación de la Universidad.

Que, de acuerdo al Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", en su Art. 30.- El asesor es un docente ordinario de la Facultad que se encuentra en actividad y que debe tener la formación profesional o en su defecto la formación relacionada con el tema materia de investigación. Es responsable de brindar orientación técnica y metodológica al bachiller, en adelante el asesorado, en el desarrollo de la tesis. El asesor garantiza la calidad académica de la investigación.

Que, mediante Oficio N°007-2024-UNICA-Fac.Obs./C.I. de fecha 14 de febrero de 2024, emitido por el presidente del Comité de Investigación de la Facultad de Obstetricia; remite el Acta N°001-2024 de Aprobación del Proyecto de Tesis titulado **Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023**, presentado por la Bach.

FATIMA ZENAIDA AZURZA RAMOS, en cumplimiento con los requisitos señalados en el Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" aprobado mediante Resolución Rectoral N°048-R-UNICA-2021.

En uso de las atribuciones conferidas a la señora decana por el Art. N°70° de la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto Universitario.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR, el Proyecto de Tesis titulado **Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023**, presentado por la **Bach. FATIMA ZENAIDA AZURZA RAMOS**, en estricto cumplimiento del Art. 32º, Inc. 9º del Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga".

Artículo 2°.- DESIGNAR como Asesora del desarrollo del Proyecto de Tesis a la **Dra. CARMEN ROSA LAOS DE AJALCRIÑA**, en cumplimiento al Art. 30º del Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga".

Artículo 3°.- OTORGAR un plazo mínimo de cuatro (04) meses que vence el 20 de junio de 2024, y un plazo máximo de 18 meses, pudiéndose prorrogar el plazo por dos (2) meses más. Vencido el plazo, el asesorado tendrá que presentar un nuevo proyecto conforme a lo dispuesto en el Art. 32.- **Procedimiento para la obtención del Título profesional**, Inc. 10 del Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga".

Artículo 4°.- INSCRIBIR en el Libro de Registro de Proyecto de Tesis aperturando una carpeta individual para la anotación de los avances del acotado proyecto de Tesis.

Regístrese, comuníquese y Archívese,

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
FACULTAD DE OBSTETRICIA

Rosa Elvira Ruiz Reyes
Dra. ROSA ELVIRA RUIZ REYES
DECANA (e)

8.7. Carta de presentación



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
FACULTAD DE OBSTETRICIA
COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
Ciudad Universitaria – Panamericana Sur Km. 305



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Ica, 19 de abril de 2024

CARTA DE PRESENTACIÓN N° 001-2024-UNICA-Fac.Obs./U.I

Señora:

Dra. Rosa Elvira Ruiz Reyes
Decana de la Facultad de Obstetricia
Universidad Nacional "San Luis Gonzaga"

Presente. -

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo a nombre de la Dirección de la Unidad de Investigación - Facultad de Obstetricia de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" y a la vez comunicarle que la **Bach. AZURZA RAMOS FATIMA ZENaida**, identificada con D.N.I. N° 71295919, egresada de la Facultad de Obstetricia de nuestra Casa Superior de Estudios, estará desarrollando su proyecto de tesis titulado: **Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 2023**; de acuerdo a la Resolución Decanal N° 017-2024-UNICA/F.Obs.-D-1 y en cumplimiento al Reglamento De Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" Capítulo V Título Profesional Art. 28° "La tesis para el título profesional debe ser inédita y de propiedad del autor. La tesis versara sobre temas de interés local, regional o nacional que aborden problemas de impacto social o académico que tenga pertinencia con el perfil profesional y que estén relacionados con las líneas de investigación de la universidad.

Asimismo, me permito solicitarle tenga a bien brindarle las facilidades correspondientes; a fin de que pueda recolectar la información correspondiente para el desarrollo de su tesis.


Agradeciéndole anticipadamente su gentil atención a lo solicitado, me despido de usted reiterándole mi aprecio y estima personal.


Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
FACULTAD DE OBSTETRICIA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Dr. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
DIRECTOR (e)

8.8. Fotografías





8.9. Cuestionario Resuelto



CUESTINARIO
Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de
emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga, 2023.



ASPECTOS GENERALES

1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS

¿Qué edad tienes?

- a. Menor de 19 años
- b. Entre 19 a 23 años
- c. 24 a más años

¿Cuál es tu estado civil?

- a. Soltera
- b. Casada
- c. Conviviente

¿Qué ciclo que estás cursando actualmente?

- a. I ciclo - III ciclo
- b. IV ciclo - VI ciclo
- c. VII ciclo - IX ciclo
- d. X ciclo

¿Cuál es tu ocupación aparte de estudiar?

- a. Estudiante
- b. Con trabajo independiente
- c. Con trabajo dependiente

¿A qué religión perteneces?

- Católica _____
- Evangélica
- Atea _____

2. FACTORES PERSONALES

¿Tienes inseguridad en la relación con tu pareja?

- Si _____
- No

¿Te sientes preparada para enfrentar este tipo de responsabilidad?

- Si _____
- No

¿Tienes temor de utilizar algún método anticonceptivo?

- Si _____
- No

3. CONDUCTA SEXUAL

¿A qué edad iniciaste tus relaciones sexuales?

- Menor de 15 años ____
- 16 a 18 años ____
- 19 a 24 años
- \geq 25 años ____

¿Has utilizado algún método anticonceptivo: Si ____ No

¿Tuviste relaciones sexuales sin protección? Si No ____

¿Cuál es la frecuencia de tus relaciones sexuales?

- Semanal ____
- Cada 15 días ____
- Cada mes ____
- Mayor a 1 mes ____

¿Cuántas parejas sexuales has tenido?

- 1 ____
- 2 a 3
- Mayor a 3 ____

4. UTILIZACIÓN DE LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE

Cantidad de utilización

- a. 1 vez al año
- b. 2 a 3 veces al año
- c. 4 a 5 veces al año
- d. Después de cada relación sexual



CUESTINARIO
**Factores predisponentes y uso del anticonceptivo de
emergencia en estudiantes de Obstetricia de la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga, 2023.**



ASPECTOS GENERALES

I. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS

¿Qué edad tienes?

- a. Menor de 19 años
- b. Entre 19 a 23 años
- c. 24 a más años

¿Cuál es tu estado civil?

- a. Soltera
- b. Casada
- c. Conviviente

¿Qué ciclo que estás cursando actualmente?

- a. I ciclo - III ciclo
- b. IV ciclo - VI ciclo
- c. VII ciclo - IX ciclo
- d. X ciclo

¿Cuál es tu ocupación aparte de estudiar?

- a. Estudiante
- b. Con trabajo independiente
- c. Con trabajo dependiente

¿A qué religión perteneces?

- Católica
- Evangélica
- Atea

2. FACTORES PERSONALES

¿Tienes inseguridad en la relación con tu pareja?

- Si
- No

¿Te sientes preparada para enfrentar este tipo de responsabilidad?

- Si
- No

¿Tienes temor de utilizar algún método anticonceptivo?

- Si
- No

3. CONDUCTA SEXUAL

¿A qué edad iniciaste tus relaciones sexuales?

- Menor de 15 años _____
- 16 a 18 años _____
- 19 a 24 años _____
- \geq 25 años _____

¿Has utilizado algún método anticonceptivo: Sí No _____

¿Tuviste relaciones sexuales sin protección? Sí No _____

¿Cuál es la frecuencia de tus relaciones sexuales?

- Semanal _____
- Cada 15 días _____
- Cada mes _____
- Mayor a 1 mes _____

¿Cuántas parejas sexuales has tenido?

- 1 _____
- 2 a 3 _____
- Mayor a 3 _____

4. UTILIZACIÓN DE LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE

Cantidad de utilización

- a. 1 vez al año
- b. 2 a 3 veces al año
- c. 4 a 5 veces al año
- d. Después de cada relación sexual