



Universidad Nacional
SAN LUIS GONZAGA



Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Esta licencia permite a otras combinar, retocar, y crear a partir de su obra de forma no comercial, siempre y cuando den crédito y licencia a nuevas creaciones bajo los mismos términos.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
FACULTAD DE ODONTOLOGIA



EVALUACION DE ORIGINALIDAD



CONSTANCIA:

El que suscribe, deja constancia que se ha realizado el análisis con el software de verificación de similitud al Informe Final de Tesis cuyo título es:

Percepción estética-funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024

Presentado por:

Bach. VIOLETA LOPEZ FRANCIS JESUS

Del nivel de PREGRADO de la Facultad de ODONTOLOGÍA, el resultado obtenido del porcentaje de similitud es el 4% por el cual se otorga el calificativo de:

APROBADO

Según Reglamento de Evaluación de Originalidad

El operador del programa informático evaluador de originalidad, aprueba el Informe Final de tesis por tener un porcentaje de similitud inferior a los límites establecidos por el reglamento.

Para dar fe se adjunta el reporte de similitud con el software de verificación de originalidad iThenticate.

Ica, 23 de setiembre de 2025



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Dr. MANUEL RICARDO ROJAS MORALES
Director de la Unidad de Investigación

Abg. YESIKA YANINA HUAMANI VALENCIA
Operador del Programa Informático
Evaluador de Originalidad
Facultad de Odontología

23-09-2025 hrs. 1:09 p.m.

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Facultad de Odontología



**Percepción estética-funcional sobre prótesis parcial removible
en pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la
ciudad de Lima, 2024**

Línea de investigación

Salud pública y conservación del medio ambiente

INFORME FINAL TESIS

Violeta López Francis Jesús

Ica, Perú

2025

Dedicatoria

A mi familia, en especial a mis padres que han sabido guiarme y apoyarme a lo largo de mi carrera, enseñándome a ser perseverante y no rendirme ante las dificultades, por lo cual estoy muy agradecido.

Agradecimientos

En primer lugar, agradecer a mi asesora Gladys Rosario Huamán Espinoza, que durante toda la realización del proyecto me apoyó. Su conocimiento y orientación fueron fundamentales para la realización de este proyecto.

En segundo lugar, a los doctores jefes de las clínicas, Odontocenter en Surco y Americana en los Olivos, gracias por el apoyo y permitirme realizar la recolección de datos de dicho proyecto.

En tercer lugar, a los pacientes que de manera cordial y con todas las ganas de colaborar me apoyaron para la ejecución de mi proyecto.

Por último, a la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, por sentar las bases de mi formación académica y permitirme tener el honor de haber conocido a docentes capacitados en su respectiva área.

ÍNDICE

ÍNDICE	iv
ÍNDICE DE TABLAS	v
ÍNDICE DE FIGURAS.....	vi
RESUMEN.....	vii
ABSTRACT.....	viii
I. INTRODUCCIÓN	9
1.1. Antecedentes.....	10
1.2. Formulación del problema	12
1.3. Justificación	12
1.4. Objetivos.....	13
II. ESTRATEGIA METODOLÓGICA.....	15
2.1. Tipo y diseño de investigación	15
2.1.1. Tipo de investigación	15
2.1.2. Diseño de investigación	15
2.2. Población y muestra.....	15
2.2.1. Población de estudio	15
2.2.2. Muestreo.....	16
2.3. Técnicas	16
2.4. Instrumento	16
2.5. Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación	17
III. RESULTADOS.....	18
IV. DISCUSIÓN	23
V. CONCLUSIONES	26
VI. RECOMENDACIONES	27
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	28
VIII. ANEXOS	31
8.1. Instrumento de recolección de datos.....	31
8.2. Consentimiento informado	33
8.3. Matriz de consistencia	34
8.4. Operacionalización de variables	37
8.5. Constancia de trabajo de campo	38
8.6. Evidencias fotográficas.....	40
8.7. Base de datos	53

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 01: La percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.	18
Tabla N° 02: La percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.	19
Tabla N°03: La percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.	20
Tabla N° 04: La percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.	21
Tabla N° 05: Determinar la percepción estético-funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N°01: La percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.	18
Figura N°02: La percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.	19
Figura N°03: La percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.	20
Figura N°04: La percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.	21
Figura N°05: Determinar la percepción estético-funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.	22

RESUMEN

Objetivo: Determinar la percepción estética-funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024. **Metodología:** La investigación es observacional de tipo básico, presenta un diseño descriptivo, no experimental, de corte transversal y retrospectivo. La población se conformó por 140 pacientes portadores de prótesis parcial removible, que son atendidos en dos consultorios odontológicos privados de la ciudad de Lima, se empleó un muestreo aleatorio simple dando como muestra a 103 pacientes, fueron evaluados por medio de una encuesta se realizará en ambientes de los consultorios particulares. **Resultados:** En la percepción estética sobre prótesis parcial removible según sexo, se observó que el 63.1% (65) son mujeres, mientras que el 36.9% (38) son hombres. En cuanto a la edad, el grupo de 40 a 49 años presentó mayor porcentaje con 37.9% (39), seguido por el grupo de 50 a 59 años con 32.0% (33) y el grupo de 60 a 65 años con 30.1% (31). Respecto a la percepción funcional sobre prótesis parcial removible, el 24.3% (25) de las mujeres y el 20.4% (21) de los hombres evaluaron la funcionalidad como alta. Según la edad, el grupo de 40 a 49 años registró la mayor proporción de funcionalidad alta, con 19.4% (20). **Conclusión:** Se determinó que, la percepción estético-funcional es alta sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.

Palabras claves: Consultorio, estético, prótesis, parcial y funcional

ABSTRACT

Objective: Determine the aesthetic-functional perception of removable partial prosthesis in patients treated in two dental offices in the city of Lima, 2024. **Methodology:** The research is basic observational, it presents a descriptive, non-experimental, cross-sectional and retrospective design. The population was made up of 140 patients with removable partial dentures, who are treated in two private dental offices in the city of Lima. Simple random sampling was used as a sample of 103 patients. They were evaluated through a survey that was carried out in environments. of private offices. **Results:** In the aesthetic perception of removable partial prosthesis according to sex, it was observed that 63.1% (65) are women, while 36.9% (38) are men. Regarding age, the group from 40 to 49 years old presented the highest percentage with 37.9% (39), followed by the group from 50 to 59 years old with 32.0% (33) and the group from 60 to 65 years old with 30.1% (31). Regarding the functional perception of removable partial prosthesis, 24.3% (25) of women and 20.4% (21) of men evaluate the functionality as high. According to age, the group between 40 and 49 years old registered the highest proportion of high functionality, with 19.4% (20). **Conclusion:** It is considered that the aesthetic-functional perception is high about removable partial prosthesis in patients treated in two dental offices in the city of Lima, 2024.

Keywords: Office, aesthetic, prosthesis, partial and functional.

I. INTRODUCCIÓN

La pérdida de dientes naturales no solo afecta la función masticatoria, la estética y la autoestima, sino que también puede tener un impacto significativo en la salud general y en la calidad de vida del individuo. (1) Esta condición puede provocar problemas digestivos debido a la masticación inadecuada, alteraciones en la fonación, cambios en la estructura facial, y dificultades para mantener una dieta equilibrada, lo que a su vez puede repercutir en la salud nutricional.(2)

Las prótesis parciales removibles (PPR) representan una opción ampliamente utilizada y accesible para abordar este problema, ya que permiten a los pacientes recuperar parcial o completamente la funcionalidad perdida.(3) Estas prótesis se elaboran generalmente con estructuras metálicas o acrílicas y dientes artificiales que reemplazan los naturales ausentes. Su diseño permite una colocación y extracción sencillas, lo cual es especialmente beneficioso para pacientes mayores o con limitaciones físicas.(4)

La popularidad de las PPR también se relaciona con su versatilidad para adaptarse a diferentes casos clínicos, desde la ausencia de uno o pocos dientes hasta edentulismo parcial en varias zonas de la cavidad oral. Además, los avances en materiales y diseño han mejorado considerablemente su confort, durabilidad y apariencia estética, lo que las hace más atractivas para los pacientes.(5)

La estética desempeña un papel esencial en la aceptación de las prótesis, ya que afecta directamente al aspecto de la sonrisa y a la armonía facial. Los pacientes tienden a valorar las soluciones que se asemejan a los dientes naturales y son discretas de llevar.(6) Por otro lado, la funcionalidad es igualmente importante, ya que una prótesis eficaz debe proporcionar comodidad y restaurar la capacidad masticatoria sin comprometer la salud oral. La interacción entre estos factores determina la percepción estético-funcional de las prótesis, influyendo en la satisfacción general de los pacientes con el tratamiento.(7)

En la ciudad de Lima, el acceso a un tratamiento dental rehabilitador puede presentar dificultades económicas y logísticas para muchos pacientes. Por ello, las prótesis son una opción viable para una rehabilitación de bajo coste y alta funcionalidad.(8) Además del costo, la decisión de utilizar este tipo de prótesis involucra aspectos culturales y sociales que afectan la aceptación del paciente y la percepción de su apariencia y función masticatoria. El estudio de estos factores puede contribuir de manera importante a entender cómo los pacientes de Lima perciben y aceptan las prótesis.(9)

Los estudios indican que la percepción que tienen los pacientes de sus prótesis influye directamente en la adherencia al tratamiento y, en consecuencia, en su calidad de vida. Los pacientes que se sienten cómodos y satisfechos con sus prótesis tienden a utilizarlas con regularidad, mientras que los que encuentran dificultades, como incomodidad o insatisfacción

estética, pueden abandonarlas. Por lo tanto, comprender la percepción estético-funcional de los pacientes es esencial para promover tratamientos que sean mejor aceptados y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos.(10)

Esta investigación tiene como objetivo explorar la percepción estético-funcional de las prótesis parciales removibles en pacientes atendidos en dos consultorios odontológicos de la ciudad de Lima.(11) La investigación se centra en cómo estos pacientes evalúan sus prótesis en términos de apariencia y funcionalidad, así como los factores que influyen en su satisfacción. Se espera que los resultados puedan contribuir al desarrollo de estrategias de tratamiento más acordes con las expectativas de los pacientes, promoviendo un mayor cumplimiento y calidad de vida.(12)

1.1. Antecedentes

Internacionales

Mieles(13) (2023) en Ecuador, tuvo como objetivo determinar la calidad de atención en las clínicas odontológicas de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en pacientes rehabilitados con prótesis parcial removible, desde la percepción del paciente. El presente estudio adoptó un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y carácter descriptivo, retrospectivo y de corte transversal, empleando el método inductivo como base del análisis. La investigación se llevó a cabo con pacientes atendidos en las clínicas odontológicas de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, teniendo como propósito evaluar la calidad del servicio clínico desde la perspectiva de usuarios rehabilitados con prótesis parciales removibles. Para ello, se aplicó una encuesta a un total de 50 participantes. La información cuantitativa recopilada fue procesada con el software IBM® SPSS® y posteriormente representada mediante gráficos estadísticos. Los hallazgos evidencian que, según la opinión de los pacientes, tanto la calidad de la atención brindada en dichas clínicas como la de las prótesis recibidas resulta satisfactoria. Se resaltan valoraciones positivas respecto al trato recibido, el cumplimiento de los horarios, la competencia demostrada por los estudiantes en los procedimientos y el nivel de satisfacción con el resultado final de las rehabilitaciones.

Nacionales

Morey(14) (2022) en Lima, tuvo como objetivo evaluar la relación del nivel de percepción de la salud oral con el estado de conservación de la prótesis parcial removible, se realizó un estudio trasversal. La muestra intencional fue de 102 adultos mayores de 60 años a más de ambos sexos. El 80% fue femenino. Para la recolección de datos se empleó el índice GOHAI, con el fin de evaluar la percepción de salud oral, y el IPC para determinar la condición protésica. Se identificó que el grupo etario de 60 a 69 años presentó la mayor participación, con un 53,9%. El 55,9% de los encuestados manifestó un nivel de percepción

“alto” y el 59,8% presentó un estado protésico calificado como “bueno”, destacando que estos dispositivos fueron utilizados entre uno y cinco años en el 54,9% de los casos. El análisis estadístico, mediante la prueba Rho de Spearman, evidenció una relación significativa entre la variable independiente y la dependiente ($p=0,000$). En consecuencia, se concluye que un mayor nivel de percepción sobre la salud oral se asocia con un mejor estado de conservación de las prótesis, lo cual está condicionado por la información oportuna que los pacientes reciban.

Acosta M.(15) (2021) en Chiclayo, tuvo como objetivo determinar la autopercepción estética en adultos parcialmente desdentados en el centro de salud de Mórrope. Fue un estudio de tipo descriptivo y diseño no experimental; la muestra fue de 193 adultos del centro de salud de Mórrope. Los datos registrados fueron de la data del centro mencionado, se utilizó un cuestionario “OHIP-Estético” versión en español. La información recolectada fue ingresada en una base de datos y procesada con el software SPSS, versión 24, lo que permitió generar tablas y gráficos útiles para dar respuesta a los objetivos planteados. Los hallazgos mostraron que, en adultos parcialmente desdentados atendidos en el centro de salud de Mórrope, la autopercepción estética presentó un nivel bajo en el 77% de los casos, mientras que solo un 1% reportó un nivel alto. Al analizar por dimensiones, los valores bajos se asociaron principalmente a dolor por dentaduras postizas mal ajustadas, molestias en la cavidad oral y prótesis incómodas. Según el género, el 63,4% de las mujeres y el 91% de los hombres manifestaron baja percepción estética, observándose una diferencia estadísticamente significativa ($p<0,05$; significancia bilateral=0,010). En cuanto a la edad, el 81% de los adultos de 60 años o más y el 73% de aquellos entre 30 y 59 años presentaron este mismo nivel bajo. En síntesis, se concluye que la autopercepción estética de los adultos parcialmente desdentados en este establecimiento de salud es predominantemente baja.

Salazar(16) (2019) en Trujillo, tuvo como objetivo evaluar la percepción estética del aspecto dental en personas adultas mayores que acuden a los establecimientos de salud de Trujillo, Víctor Larco y La Esperanza. Se incluyó un total 180 adultos mayores y se utilizó “El Perfil de Impacto de la Salud Oral” (Oral Health Impact Profile – Aesthetic) [OHIP-Estético]. Los resultados mostraron que el 46% (82) de los adultos mayores evaluados presentó un nivel moderado de percepción estética del aspecto dental. Al analizar por grupos etarios, se observó que la mayor proporción en este nivel correspondió a personas de 60 a 70 años, con un 26%. En cuanto al género, las mujeres concentraron un 31% (56) en el nivel moderado y un 17% (30) en el nivel alto. Respecto a la presencia de prótesis dentales, quienes las utilizaban registraron un 27,2% (49) en el nivel moderado, mientras que aquellos sin prótesis alcanzaron un 12,2% (21) en el nivel alto. El análisis estadístico evidenció diferencias significativas entre los grupos ($p=0,028 < 0,05$). Entre las

dimensiones evaluadas, la de discomfort psicológico fue la predominante. En conclusión, la percepción estética del aspecto dental en los adultos mayores que asistieron a los centros de salud de Trujillo, Víctor Larco y La Esperanza se ubica principalmente en un nivel moderado.

1.2. Formulación del problema

Problema general

Pg. ¿Cuál es la percepción estético-funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024?

Problemas específicos

Pe1. ¿Cuál es la percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024?

Pe2. ¿Cuál es la percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024?

Pe3. ¿Cuál es la percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024?

Pe4. ¿Cuál es la percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024?

1.3. Justificación

Justificación teórica

Esta investigación ofrecerá aportes significativos y fundamentos teóricos relevantes sobre la autopercepción estética y funcional en adultos con pérdida parcial de piezas dentarias, considerando su impacto tanto en el bienestar personal como en la calidad de vida en general. Se propone un marco de análisis que permita comprender la salud bucal más allá de un enfoque estrictamente científico sujeto a validación empírica, reconociendo que los componentes estético y funcional se encuentran estrechamente interrelacionados.

Justificación práctica

A través de esta investigación se generarán datos que podrán servir como base para optimizar las técnicas empleadas en los tratamientos de rehabilitación, contribuyendo así a reducir la incidencia del edentulismo, minimizar los errores en la atención clínica y aumentar las tasas de éxito. De este modo, los pacientes —considerados el principal recurso humano en el proceso— experimentarán mejoras tanto en la estética como en la funcionalidad oral.

Justificación metodológica

La relevancia de esta investigación radica en que permitió conocer las distintas perspectivas de los adultos parcialmente desdentados que acuden a consultorios odontológicos privados en Lima, identificando su autopercepción estético-funcional y determinando si requieren distintos niveles de intervención rehabilitadora como parte de un estándar de atención para optimizar su condición oral. Asimismo, aportó a los consultorios de la ciudad una comprensión más profunda sobre las implicancias de la pérdida prematura de dientes en la población adulta. Resulta fundamental evaluar el nivel de autopercepción de las personas parcialmente desdentadas, ya sean portadoras o no de prótesis parciales removibles, pues esta información es clave para fomentar una cultura de prevención que evite la pérdida temprana de piezas dentarias. Con ello, se busca reducir la necesidad de prótesis a edades tempranas y mejorar tanto la satisfacción personal como la funcionalidad y la estética oral.

1.4. Objetivos

Objetivo general

Og. Determinar la percepción estético-funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.

Objetivos Específicos

Oe1. Medir la percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.

Oe2. Medir la percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.

Oe3. Medir la percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.

Oe4. Medir la percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.

Donde el I capítulo nos brinda un preámbulo general. Realidad problemática, citando y comentando investigaciones recientemente realizadas (antecedentes) justificando la necesidad de realizar la investigación. Asimismo, se señalaron los objetivos o el propósito de la investigación.

El capítulo II desarrolla la estrategia metodológica utilizada, siguiendo los lineamientos científicos exigidos por la universidad, y describe el tipo, nivel y diseño de investigación, así como las técnicas e instrumentos empleados para la recolección de datos.

En el capítulo III, los resultados se presentan por medio de tablas y gráficos para una mejor comprensión de los datos resultantes, sumado además sus respectivas interpretaciones descriptivas.

Teniendo estos en consideración para en el capítulo IV, se expone la discusión, integrando una interpretación teórica y objetiva de los hallazgos en contraste con los aportes de otros autores que han abordado el mismo problema, lo que permite consolidar ideas y conceptos más precisos.

Las conclusiones llegaron después de todo este proceso se manifiestan en el capítulo V, bajo los cuales se mencionó de manera oportuna las recomendaciones del capítulo VI, como aporte para la mejora continua en torno al tema investigado.

El capítulo VII recopila las referencias bibliográficas empleadas, siguiendo las normas establecidas por la universidad. Finalmente, el capítulo VIII reúne las matrices, instrumentos y demás evidencias que respaldan y orientaron el desarrollo exitoso de la investigación.

II. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

2.1. Tipo y diseño de investigación

2.1.1. Tipo de investigación

Cuantitativo observacional al utilizar pruebas estadísticas para lograr los objetivos planteados, básico no experimental puesto que no se manipulará de ninguna manera la variable de estudio.

2.1.2. Diseño de investigación

La investigación es de un diseño descriptivo puesto que buscó presentar de manera detallada y dimensionada los resultados de la investigación. De corte transversal al realizar la recolección de los datos en un momento determinado. Prospectivo ya que la información fue obtenida directamente de los participantes mediante la aplicación de una encuesta.

2.2. Población y muestra

2.2.1. Población de estudio

Población

La población está constituida por los pacientes portadores de prótesis parcial removible que reciben atención en dos consultorios odontológicos privados en la ciudad de Lima: Odontocenter, ubicado en el distrito de Surco, y el Centro Odontológico Americana, en el distrito de Los Olivos. La población total es de 140 pacientes por trimestre.

Muestra

Una muestra es un subgrupo de la población, digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se llama población. Hernández et al. (2014)(17)

Asimismo, para la elaboración de la muestra se empleó la fórmula de población finita, refieren que:

$$n = \frac{k^2 * p * q * N}{(e^2 * (N - 1)) + k^2 * p * q}$$

Dónde:

Tamaño poblacional: N = 140

Nivel de Confiabilidad: 95 % z = 1,96

Proporción de P: p = 0.5

Error de muestreo: e = 0.05

Tamaño de muestra: n = 103 pacientes.

2.2.2. Muestreo

Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando a los pacientes atendidos durante el periodo del estudio que cumplían con los criterios de inclusión.

Técnicas

La técnica que se aplicó es la encuesta, la cual se realizó en los ambientes de los consultorios odontológicos particulares mencionados. Donde se explicó previamente a los participantes sobre la investigación que se está llevando a cabo y los objetivos de este. Asimismo, sobre la forma de trata de los datos que brindaran.

Hecho esto se procedió a la firma del consentimiento informado por cada participante. Luego tuvieron hasta 20 minutos para realizar el desarrollo de la encuesta, con acompañamiento del investigador para resolver cualquier duda que pueda presentarse.

2.3. Instrumento

Se utilizó una encuesta como instrumento para la recolección de los datos necesarios para el cumplimiento de los objetivos.

La encuesta recoge los datos de caracterización de la población, además cuenta con 18 preguntas en una escala de Likert; distribuidas en dos dimensiones (Estética – Funcional) con 09 preguntas cada una. Teniendo los siguientes datos para la baremación:

Nunca = 0 puntos Rara vez = 1 punto Ocasionalmente = 3 puntos

Muy a menudo = 4 puntos Siempre = 5 puntos

Percepción estética

Baja = 35 a 45 puntos

Medio = 22 a 34 puntos

Alta = 9 a 21 puntos

Percepción Funcional

Baja = 35 a 45 puntos

Medio = 22 a 34 puntos

Alta = 9 a 21 puntos

Percepción estético-funcional

Baja = 70 a 90 puntos

Medio = 44-69 puntos

Alta = 18 a 43 puntos

Validación

El instrumento tiene como base las investigaciones de Rodrigo Chirinos María Alejandra “Autopercepción Estética Y Funcional De Los Pacientes Rehabilitados Con Prótesis Parcial Removible En La Clínica Estomatológica De La Universidad Señor De Sipán, 2018”(18) y Salazar Ríos Karen “Percepción Estética Del Aspecto Dental En Personas Adultas Mayores Que Acuden A Los Establecimientos De Salud, Trujillo – La

Libertad”(16). Los cuales fueron adecuados a la realidad de la población y características propias para el logro de los objetivos, por lo cual es validado por el proceso de juicio de expertos.

2.4. Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación

Los datos obtenidos fueron ingresados en una base de datos y analizados mediante el software estadístico SPSS, versión 26.0 (Statistical Package for the Social Sciences) (Mayorga et al., 2021)(19)

La información se analizó conforme a los objetivos planteados en la investigación. Con la variable se realizó un estudio descriptivo, examinando medias y desviaciones estándar en base a frecuencias cuantitativas y absolutas, y porcentajes en base a frecuencias cualitativas.


Se utilizó Microsoft Excel 2019 para preparar las tablas y gráficos correspondientes. (González, 2007)(20)

III. RESULTADOS

Tabla N° 01: La percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.

		Sexo		Total
		Femenino	Masculino	
Percepción estética	Baja	n	14	20
		%	13.6%	19.4%
	Medio	n	34	47
		%	33.0%	45.6%
	Alta	n	17	36
		%	16.5%	35.0%
Total		n	65	103
		%	63.1%	100.0%

Figura N°01: La percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.




Interpretación: En la tabla y gráfico N°01, en cuanto a la percepción estética de la prótesis parcial removible, se identificó que el 13.6% (14) de las mujeres y el 5.8% (6) de los hombres calificaron la estética como baja, representando un total del 19.4% (20). Por otro lado, el 33.0% (34) de las mujeres y el 12.6% (n=13) de los hombres la percibieron como media, alcanzando el 45.6% (47). Finalmente, el 16.5% (17) de las mujeres y el 18.4% (19) de los hombres consideraron la estética como alta, sumando un 35.0% (36). La mayoría de los participantes fueron mujeres, representando el 63.1% (65) de la muestra, mientras que los hombres el 36.9% (38).

Tabla N° 02: La percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.

			Edad			
			40 a 49 años	50 a 59 años	60 a 65 años	Total
Percepción estética	Baja	n	7	6	7	20
		%	6.8%	5.8%	6.8%	19.4%
	Medio	n	18	16	13	47
		%	17.5%	15.5%	12.6%	45.6%
	Alta	n	14	11	11	36
		%	13.6%	10.7%	10.7%	35.0%
Total	n	39	33	31	103	
	%	37.9%	32.0%	30.1%	100.0%	

Figura N°02: La percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.




Interpretación: En la tabla y gráfico N°02, en la percepción estética según la edad, en el grupo de 40 a 49 años, el 6.8% (7) calificó la estética como baja, el 17.5% (n=18) como media y el 13.6% (14) como alta. Entre los pacientes de 50 a 59 años, el 5.8% (6) tuvo una percepción baja, el 15.5% (16) media y el 10.7% (11) alta. En el rango de 60 a 65 años, el 6.8% (7) calificó la estética como baja, el 12.6% (13) como media y el 10.7% (11) como alta. Por último, se encontró mayor porcentaje en el grupo de 40 a 49 años con 37.9% (39), seguido del grupo de 50 a 59 años con un 32.0% (33) y el de 60 a 65 años con un 30.1% (31).

Tabla N°03: La percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.

		Sexo		Total	
		Femenino	Masculino		
Percepción funcional	Baja	n	13	6	19
		%	12.6%	5.8%	18.4%
	Medio	n	27	11	38
		%	26.2%	10.7%	36.9%
	Alta	n	25	21	46
		%	24.3%	20.4%	44.7%
	Total	n	65	38	103
		%	63.1%	36.9%	100.0%

Figura N°03: La percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.




Interpretación: En la tabla y gráfico N°03, en la percepción funcional de las prótesis removibles según el sexo. El 12.6% (13) de las mujeres y el 5.8% (6) de los hombres calificaron la funcionalidad como baja, representando un 18.4% (19). El 26.2% (27) de las mujeres y el 10.7% (11) de los hombres valoraron la funcionalidad como media, alcanzando un 36.9% (38). Por último, el 24.3% (25) de las mujeres y el 20.4% (21) de los hombres consideraron la funcionalidad como alta, logrando un total del 44.7% (46).

Tabla N° 04: La percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.

		Edad			Total	
		40 a 49 años	50 a 59 años	60 a 65 años		
Percepción funcional	Baja	n	7	6	6	19
		%	6.8%	5.8%	5.8%	18.4%
	Medio	n	12	13	13	38
		%	11.7%	12.6%	12.6%	36.9%
	Alta	n	20	14	12	46
		%	19.4%	13.6%	11.7%	44.7%
Total	n	39	33	31	103	
	%	37.9%	32.0%	30.1%	100.0%	

Figura N°04: La percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.




Interpretación: En la tabla y gráfico N°04, la percepción funcional según la edad se observó que el 6.8% (7) de los pacientes de 40 a 49 años calificó la funcionalidad como baja, el 11.7% (12) como media y el 19.4% (20) como alta. En el rango de 50 a 59 años, el 5.8% (6) percibió la funcionalidad como baja, el 12.6% (13) como media y el 13.6% (14) como alta. Finalmente, en el grupo de 60 a 65 años, el 5.8% (6) valoró la funcionalidad como baja, el 12.6% (13) como media y el 11.7% (12) como alta. El grupo de 40 a 49 años presentó la mayor proporción de funcionalidad alta, con un 19.4% (20) de los casos.

Tabla N° 05: Determinar la percepción estético-funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.

		n	%
Estético-funcional	Baja	19	18.4%
	Medio	38	36.9%
	Alta	46	44.7%
	Total	103	100.0%

Figura N°05: Determinar la percepción estético-funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.



Interpretación: En la tabla y gráfico N°05, en la percepción estético-funcional de las prótesis parciales removibles, se observó que el 18.4% (19) de los participantes calificó su experiencia como baja, el 36.9% (38) como media y el 44.7% (46) como alta. Esto indica que hubo mayor porcentaje en la percepción alta en cuanto a los aspectos estético-funcionales de las prótesis.

IV. DISCUSIÓN

La percepción estético-funcional de las prótesis parciales removibles en adultos, al analizarse cómo los pacientes califican tanto la estética y la funcionalidad de las prótesis, y comparando estos resultados con estudios previos en diversas regiones. Los resultados obtenidos muestran una variedad de percepciones entre los participantes, lo que refleja tanto satisfacciones como áreas de mejora en los aspectos funcionales y estéticos de las prótesis.

En el análisis de la percepción estético-funcional, los resultados indican que un 44.7% de los participantes calificaron su experiencia como alta en cuanto a los aspectos estético-funcionales de las prótesis, mientras que un 36.9% tuvo una percepción media y solo un 18.4% consideró la experiencia baja. Este hallazgo sugiere que la mayoría de los participantes tienen una percepción positiva de las prótesis parciales removibles en cuanto a su estética y funcionalidad, aunque no de forma unánime.

Este patrón es consistente con los resultados encontrados en estudios previos. Por ejemplo, Mieles (2023) en su estudio sobre la calidad de atención en las clínicas odontológicas de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, reveló una satisfacción positiva en la mayoría de los pacientes con las prótesis parciales removibles, destacando aspectos como la atención al cliente, la competencia de los estudiantes y la calidad de las prótesis, lo cual se refleja también en este estudio. La percepción positiva encontrada en nuestro estudio es un indicio de que, a pesar de las posibles críticas menores, los pacientes en general parecen estar satisfechos con el tratamiento recibido.

Sin embargo, la percepción media de un 36.9% de los participantes y la percepción baja de un 18.4% sugieren que existen áreas de mejora, en particular en términos de funcionalidad o confort. Esto es consistente con los estudios de Morey (2022), que encontraron que el 80% de los participantes tenían una percepción positiva de sus prótesis, pero también destacaron que aquellos que no recibían educación sobre su uso y cuidado tenían más dificultades con la conservación y el ajuste de las prótesis. Esta comparación indica que, si bien la mayoría de los pacientes tienen una buena percepción, aún persiste un número importante que podría beneficiarse de un seguimiento y asesoramiento adicional.

En cuanto a la percepción estética de las prótesis, los resultados mostraron que un 35.0% de las mujeres y un 18.4% de los hombres calificaron la estética de las prótesis como alta, mientras que el 19.4% de los participantes en total las calificaron como baja. La percepción estética es un componente fundamental de la satisfacción de los pacientes con las prótesis dentales, y este estudio revela que, si bien la mayoría de los participantes calificaron la estética como adecuada, aún existe un porcentaje significativo de personas que consideran que las prótesis no cumplen con sus expectativas estéticas.

Este hallazgo puede compararse con el estudio de Salazar (2019), que también encontró una percepción moderada de la estética en una población de adultos mayores. En ese estudio, el 46% de los participantes calificaron la estética de sus prótesis como moderada, lo que sugiere que la calidad estética de las prótesis es una preocupación común en varias regiones. De manera similar, el estudio de Acosta MV. (2021) sobre la autopercepción estética en adultos parcialmente desdentados en Chiclayo encontró que la mayoría de los pacientes tenían una percepción baja de la estética de sus prótesis, lo que refleja una preocupación persistente por los aspectos visuales de las prótesis.

Sin embargo, a pesar de las similitudes, en nuestro estudio la diferencia de género en la percepción estética es relevante: las mujeres reportaron una mejor percepción estética (35%) en comparación con los hombres (18.4%). Este patrón podría estar relacionado con la mayor preocupación por la estética dental que las mujeres suelen tener en comparación con los hombres, como también se señaló en el estudio de Salazar (2019), donde las mujeres tuvieron una mayor incidencia en las percepciones estéticas moderadas y altas. Esta diferencia de género es importante, ya que sugiere que las prótesis dentales pueden necesitar ajustes más específicos dependiendo del paciente.

En cuanto a la percepción funcional de las prótesis removibles, los resultados fueron similares a los de la percepción estética. Un 44.7% de los participantes consideraron la funcionalidad como alta, un 36.9% la calificaron como media y el 18.4% restante la calificó como baja. Esta tendencia hacia una percepción mayoritariamente positiva de la funcionalidad es consistente con la investigación de Morey (2022), que también mostró que aquellos que percibían una mayor calidad en su salud oral también informaban una mayor satisfacción con el estado de conservación de sus prótesis. En este sentido, el hecho de que una porción significativa de los pacientes (36.9%) todavía tenga una percepción media sobre la funcionalidad refleja la importancia de continuar con el seguimiento y las mejoras en el ajuste de las prótesis.

Al comparar los resultados por edad, encontramos que el grupo de pacientes de 40 a 49 años fue el que más reportó una alta percepción funcional, con un 19.4% de los casos. Este dato es consistente con el estudio de Acosta MV. (2021), que también encontró que los adultos más jóvenes (en este caso, de 30 a 59 años) reportaron una mayor satisfacción con la funcionalidad de sus prótesis en comparación con los adultos mayores. En el estudio de Salazar (2019), se evidenció que las personas con prótesis dentales tenían una percepción más moderada de la funcionalidad, lo que podría estar relacionado con la menor adaptabilidad o la mayor sensibilidad de los adultos mayores a los dispositivos dentales.

Los resultados también muestran una distribución de las percepciones estéticas y funcionales según la edad. En el grupo de 40 a 49 años, el 37.9% reportó una percepción media de la estética, y el 19.4% percibió la funcionalidad como alta, lo que sugiere que los adultos más jóvenes tienen

una experiencia más positiva en ambos aspectos. Esto contrasta con los adultos mayores (60-65 años), quienes fueron más propensos a calificar ambas percepciones como moderadas o bajas. Este patrón se observa en los estudios previos, donde se observó que la edad avanzada estaba asociada a una percepción más baja de la estética y funcionalidad de las prótesis. En conclusión, los resultados de este estudio muestran una percepción en su mayoría positiva sobre los aspectos estético-funcionales de las prótesis parciales removibles, aunque aún existen áreas significativas de insatisfacción, especialmente entre los grupos de mayor edad y entre los hombres.

V. CONCLUSIONES

Primero: Se determinó que, la percepción estético-funcional sobre prótesis parcial removible es alta en los pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.

Segundo: La percepción estética sobre prótesis parcial removible según sexo evidenció mayor prevalencia en la valoración media, en mujeres atendidas en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.

Tercero: La percepción estética sobre prótesis parcial removible según la edad presentó mayor porcentaje en el grupo de 40 a 49 años con una percepción media.

Cuarto: La percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según sexo presentó una valoración alta, siendo las mujeres con mayor porcentaje.

Quinto: La percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad, en el grupo de 40 a 49 años presentó mayor porcentaje de funcionalidad alta.

VI. RECOMENDACIONES

- Implementar programas educativos dirigidos a los pacientes que aborden la importancia de las prótesis parciales removibles en la restauración estética y funcional, para mejorar la aceptación y uso adecuado del tratamiento.
- Fomentar evaluaciones regulares e individualizadas por parte de los profesionales dentales para asegurar que las prótesis se ajusten a las expectativas estéticas y funcionales de cada paciente, mejorando la personalización del tratamiento.
- Realizar seguimientos a largo plazo con los pacientes para evaluar su satisfacción continua con las prótesis y realizar los ajustes necesarios que optimicen tanto su funcionalidad como su estética.
- Brindar capacitaciones a los técnicos protésicos para asegurar que los diseños de las prótesis sean más precisos y confortables, tomando en cuenta tanto los aspectos estéticos como funcionales, lo que contribuirá a una mayor satisfacción de los pacientes.
- Fomentar la investigación y desarrollo de nuevos materiales y tecnologías en la fabricación de prótesis parciales removibles, para mejorar la durabilidad, comodidad y apariencia de las prótesis, con el fin de ofrecer soluciones más innovadoras y efectivas a los pacientes.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Arteaga A, López A, Burbano F, Coral Y, Escobar J, Lara J, et al. Nivel de autoestima en pacientes con pérdida de uno o más dientes anteriores atendidos en la clínica odontológica de la universidad cooperativa de Colombia, campus pasto. [Internet]. [citado 25 de junio de 2025]. Disponible en: <https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/00558aa8-fac5-472f-8bfa-58eacddad19c>
2. Buitrón A. Problemas gastrointestinales y su relación con la ausencia de piezas dentales en adultos mayores. 3 de diciembre de 2024 [citado 25 de junio de 2025]; Disponible en: <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14250>
3. Chaple M. Rendimiento y fuerza masticatoria máxima funcional en pacientes con prótesis parcial removible dentomucosoportadas y dentoimplantosoportadas [Internet]. [citado 25 de junio de 2025]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-750702024000100014&script=sci_arttext
4. Rodríguez S. Prácticas de higiene, cuidado y mantenimiento de prótesis completa en pacientes Edéntulos totales que asisten a la “Casa del Adulto Mayor”, de la municipalidad del distrito de La Esperanza, departamento de La Libertad, 2015. 7 de mayo de 2022 [citado 25 de junio de 2025]; Disponible en: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/26657>
5. Valdera C. Conocimiento sobre los cuidados e higiene post instalación de prótesis removible convencional en odontólogos colegiados de Chiclayo, 2022. 2023 [citado 23 de marzo de 2024]; Disponible en: <http://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/6127>
6. Macías Y, Mera S. Importancia y funcionamiento integral de la rehabilitación con prótesis dental parcial removible. [citado 23 de marzo de 2024]; Disponible en: <http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2713>
7. Sahari V. Influencia del proceso de comunicación entre odontólogo y técnico protesista dental en la elaboración de prótesis parcial removible, 2021 B. [citado 23 de marzo de 2024]; Disponible en: <http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/138727>
8. Campbell S, Cooper L, Craddock H, Hyde T, Nattress B, Pavitt S, et al. Removable partial dentures: The clinical need for innovation. Journal of Prosthetic Dentistry [Internet]. 1 de septiembre de 2017 [citado 22 de marzo de 2024];118(3):273-80. Disponible en: <https://odluismarcano.com/protesis-dentales/protesis-parciales-removibles/>

9. Arana M. Relación entre el nivel socioeconómico y el cuidado de la prótesis parcial removible en los ciudadanos del distrito de los Olivos - 2021. [citado 23 de marzo de 2024]; Disponible en: <https://repositorio.uap.edu.pe/handle/20.500.12990/9832>
10. Gutiérrez A. Las prótesis removibles, comodidad para pacientes que necesitan prótesis dentales | Blogs Quirónsalud [Internet]. [citado 23 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://www.quironsalud.com/blogs/es/salud-comienza-boca/protesis-removibles-comodidad-pacientes-necesitan-protesis>
11. Flores L. Vista de Tratamiento ortodóntico en pacientes para la rehabilitación con prótesis parciales en la clínica Zurident, Santo Domingo. Ecuador [Internet]. [citado 23 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://revgacetaestudiantil.sld.cu/index.php/gme/article/view/100/234>
12. Ipanaque J. Rehabilitación oral de edéntulo superior con prótesis dental superior reporte de un caso clínico. [citado 23 de marzo de 2024]; Disponible en: <https://repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/6302>
13. Míeles M. Calidad de rehabilitación con prótesis dental realizada por estudiantes desde la percepción del paciente. 2023 [citado 23 de marzo de 2024]; Disponible en: <http://repositorio.sangregorio.edu.ec:8080/handle/123456789/3273>
14. Morey M. Nivel de percepción de la salud oral en relación al estado de conservación de la prótesis parcial removible en adultos mayores. 2022 [citado 23 de marzo de 2024]; Disponible en: <https://repositorio.uap.edu.pe/xmlui/handle/20.500.12990/11240>
15. Acosta MV. Autopercepción estética en adultos parcialmente desdentados del centro de salud de Morrope, 2019. [Internet]. [citado 23 de marzo de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/1530>
16. Salazar K. Percepción estética del aspecto dental en personas adultas mayores que acuden a los establecimientos de salud, Trujillo - la libertad. Universidad Privada Antenor Orrego [Internet]. 2019 [citado 23 de marzo de 2024]; Disponible en: <https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/5968>
17. Hernández R, Fernández C, Baptista M. Metodología de la investigación. Metodología de la investigación [Internet]. 2014 [citado 22 de noviembre de 2024];91. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775008&info=resumen&idioma=SPA>
18. Rodrigo M. Autopercepción estética y funcional de los pacientes rehabilitados con prótesis parcial removible en la clínica estomatológica de la Universidad Señor De Sipán, 2018.

[citado 23 de marzo de 2024]; Disponible en:
<https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/6144>

19. Mayorga R, Monroy A, Hernández J, Roldan A, Reyes S. Programa SPSS. Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo [Internet]. 5 de diciembre de 2021 [citado 23 de marzo de 2024];10(19):282-4. Disponible en:
<https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ICSA/article/view/7761>
20. González L. Microsoft Excel: una herramienta para la investigación. Medisur [Internet]. 23 de octubre de 2007 [citado 23 de marzo de 2024];4(3):68-71. Disponible en:
<https://medisur.sld.cu>, medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/225

VIII. ANEXOS

8.1. Instrumento de recolección de datos

Cuestionario estético-funcional para pacientes portadores de prótesis parcial removible.

Sexo: (Femenino) (Masculino)

Edad: _____

Estético					
1. ¿Está conforme con el aspecto de los dientes de su prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
2. ¿Ha estado usted un poco avergonzado por problemas con sus dientes?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
3. ¿Ha evitado usted sonreír por problemas con sus prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
4. ¿Se ha sentido deprimido por problemas en el uso de su prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
5. ¿Es consciente de cual sería su apariencia facial al no usar su prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
6. ¿Ha sentido usted que su apariencia ha sido afectada por problemas con sus prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
7. ¿Ha sentido usted incomodidad por la apariencia de sus dientes?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
8. ¿Ha sido incapaz de disfrutar mucho la compañía de otra gente por problemas con sus dientes?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
9. ¿Ha sentido usted que la vida en general fue menos satisfactoria desde que utiliza prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre

Funcional					
10. ¿Ha notado usted que su prótesis no le permite hablar correctamente?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
11. ¿Siente que la prótesis que usa retiene alimentos?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
12. ¿Ha sentido usted que su prótesis no ajusta apropiadamente en su boca?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
13. ¿Ha sentido usted que se le cae su prótesis cuando la usa?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
14. ¿Ha sentido usted menos sabor en sus alimentos cuando usa su prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
15. ¿Ha tenido dificultades mordiendo algún alimento cuando usa su prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
16. ¿Ha sentido que su digestión ha empeorado por problemas con su prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
17. ¿Ha tenido usted áreas dolorosas en su boca al utilizar la prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
18. ¿Ha tenido usted dificultades haciendo su rutina habitual por problemas con su prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre

Puntaje Estético: _____ **Puntaje Funcional:** _____

Puntaje total estético-funcional: _____

8.2. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Por medio de la presente autorizo someterme a ser participe del estudio de investigación denominado Percepción estética-funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024 que será realizado por el bachiller Violeta López Francis Jesús, de la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Este estudio servirá para poder saber cuál es la percepción estética – funcional sobre prótesis parcial removible. Por medio de este documento autorizo a que se le realice la revisión requerida y éste brinde los datos que necesita el investigador. Se me informa además que ninguna de estas actividades pondrá en riesgo su salud ni de los otros participantes en el estudio y el material obtenido solo será utilizado para estudios de investigación. Agradeciendo su colaboración y de estar de acuerdo para participar en el presente estudio de investigación, sírvase a firmar la autorización.

Nombre y apellidos _____

SEXO: M () F ()

FIRMA

8.3. Matriz de consistencia

Título de la Investigación: Percepción estética-funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	METODOLOGÍA
<u>General</u>	<u>General</u>	<u>General</u>	Percepción estético- funcional	- Estética - Funcional	Tipo: Observacional con enfoque cuantitativo. Nivel de estudio: Descriptivo Diseño: No experimental, de corte transversal, prospectivo. Población: Conformada por 140 pacientes portadores de prótesis parcial removible.
PG. ¿Cuál es la percepción estético-funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024?	Og. Determinar la percepción estético- funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024.	Al ser un trabajo descriptivo no corresponde la formulación de una hipótesis.			
<u>Específicas</u>	<u>Específicas</u>				
Pe1. ¿Cuál es la percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024?	Oe1. Medir la percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024				

Pe2. ¿Cuál es la percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024?	Oe2. Medir la percepción estética sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024				Muestra: 103 pacientes Técnica e instrumento de recolección de información: Se aplicará una encuesta, que consta con 18 preguntas, distribuido en dos dimensiones (Estética – Funcional). Técnicas de análisis estadístico de datos: La técnica utilizada es un análisis descriptivo.
Pe3. ¿Cuál es la percepción funcional sobre prótesis parcial removible	Oe3. Medir la percepción funcional sobre prótesis parcial removible en				

en pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024?	pacientes según sexo atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024				
Pe4. ¿Cuál es la percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024?	Oe4. Medir la percepción funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes según edad atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024				

8.4. Operacionalización de variables

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	VALOR FINAL	ESCALAS DE MEDICIÓN	INSTRUMENTOS	FUENTE
Percepción estético-funcional	Se refiere a la forma en que las personas perciben y experimentan objetos, espacios o elementos que combinan tanto aspectos estéticos como funcionales.	Es la capacidad de un individuo para evaluar y apreciar la combinación de aspectos estéticos y funcionales de un objeto, espacio o elemento.	Estética Funcional	- Baja - Medio - Alta	- 70 a 90 puntos - 44 a 69 puntos - 18 a 43 puntos	- Ordinal	- Encuesta	Título de investigación: <u>Rodrigo Chirinos María Alejandra.pdf</u> (uss.edu.pe) y <u>re esto karen. salazar percepcion.estetica_datos.pdf</u> (upao.edu.pe)

8.5. Constancia de trabajo de campo

ODONTOCENTER
Clínica Dental Especializada

CONSTANCIA DE TRABAJO DE CAMPO

Por medio de la presente, se hace constar que **Francis Jesús Violeta López**, bachiller de la carrera de **odontología** de la universidad San Luis Gonzaga de Ica, ha realizado trabajo de campo como parte de su proyecto de tesis titulado:

"Percepción estético-funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dental de la ciudad de Lima, 2024".

El trabajo de campo se llevó a cabo en nuestra clínica dental especializada ODONTOCENTER ubicado en la avenida aviación 4929 – Surco, entre las fechas de julio y octubre del presente año cumpliendo con las actividades de investigación, recolección de datos y observación en el área de estudio correspondiente.

El estudiante ha demostrado una actitud profesional, compromiso y responsabilidad en el desarrollo de las actividades, las cuales fueron supervisadas por la Dra. Jhyna Gutiérrez Aparco, COP 28526

Esta constancia se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes.

Atentamente,


Dra. Jhyna Gutiérrez Aparco
CIRUJANO DENTISTA
Esp. Periodoncia e Implantología
COP 28526 RNE 2068

CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO AMERICANA

CONSTANCIA DE TRABAJO DE CAMPO

Por medio de la presente, se hace constar que **Francis Jesús Violeta López**, bachiller de la carrera de **odontología** de la universidad San Luis Gonzaga de Ica, ha realizado trabajo de campo como parte de su proyecto de tesis titulado:

"Percepción estético-funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dental de la ciudad de Lima, 2024".

El trabajo de campo se llevó a cabo en nuestra clínica dental AMERICANA ubicado en la av. Próceres de huandoy 7811 – los Olivos , entre las fechas de julio y octubre del presente año cumpliendo con las actividades de investigación, recolección de datos y observación en el área de estudio correspondiente.

El estudiante ha demostrado una actitud profesional, compromiso y responsabilidad en el desarrollo de las actividades, las cuales fueron supervisadas por la Dra. Cindy Maite Tovar Violeta, COP 50891

Esta constancia se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes.

Atentamente,


Dra. Cindy Tovar Violeta
CIRUJANA DENTISTA
C.O.P. 50891

8.6. Evidencias fotográficas

Cuestionario estético-funcional para pacientes portadores de prótesis parcial removible.

Sexo: (Femenino) (Masculino)

Edad: _____

Estético					
1. ¿Está conforme con el aspecto de los dientes de su prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
2. ¿Ha estado usted un poco avergonzado por problemas con sus dientes?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
3. ¿Ha evitado usted sonreír por problemas con sus prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
4. ¿Se ha sentido deprimido por problemas en el uso de su prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
5. ¿Es consciente de cual sería su apariencia facial al no usar su prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
6. ¿Ha sentido usted que su apariencia ha sido afectada por problemas con sus prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
7. ¿Ha sentido usted incomodidad por la apariencia de sus dientes?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
8. ¿Ha sido incapaz de disfrutar mucho la compañía de otra gente por problemas con sus dientes?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
9. ¿Ha sentido usted que la vida en general fue menos satisfactoria desde que utiliza prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
Funcional					
10. ¿Ha notado usted que su prótesis no le permite hablar correctamente?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre

	correctamente?					
11.	¿Siente que la prótesis que usa retiene alimentos?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
12.	¿Ha sentido usted que su prótesis no ajusta apropiadamente en su boca?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
13.	¿Ha sentido usted que se le cae su prótesis cuando la usa?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
14.	¿Ha sentido usted menos sabor en sus alimentos cuando usa su prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
15.	¿Ha tenido dificultades masticando algún alimento cuando usa su prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
16.	¿Ha sentido que su digestión ha empeorado por problemas con su prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
17.	¿Ha tenido usted áreas dolorosas en su boca al utilizar la prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre
18.	¿Ha tenido usted dificultades haciendo su rutina habitual por problemas con su prótesis?	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Muy a menudo	Siempre

Puntaje Estético: _____ Puntaje Funcional: _____

Puntaje total estética-funcional: _____

CONSENTIMIENTO INFORMADO


Por medio de la presente autorizo someterme a ser participe del estudio de investigación denominado Percepción estética-funcional sobre prótesis parcial removible en pacientes atendidos en dos consultorios dentales de la ciudad de Lima, 2024 que será realizado por el bachiller Violeta López Francis Jesús, de la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Este estudio servirá para poder saber cuál es la percepción estética – funcional sobre prótesis parcial removible. Por medio de este documento autorizo a que se le realice la revisión requerida y éste brinde los datos que necesita el investigador. Se me informa además que ninguna de estas actividades pondrá en riesgo su salud ni de los otros participantes en el estudio y el material obtenido solo será utilizado para estudios de investigación. Agradeciendo su colaboración y de estar de acuerdo para participar en el presente estudio de investigación, sírvase a firmar la autorización.

Nombre y apellidos _____

Sexo : M () F ()

FIRMA





















8.7. Base de datos

[illegible][illegible]