



Universidad Nacional

SAN LUIS GONZAGA



Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Esta licencia permite a otras combinar, retocar, y crear a partir de su obra de forma no comercial, siempre y cuando den crédito y licencia a nuevas creaciones bajo los mismos términos.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>

**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
FACULTAD DE ODONTOLOGIA**



EVALUACION DE ORIGINALIDAD



CONSTANCIA:

El que suscribe, deja constancia que se ha realizado el análisis con el software de verificación de similitud al Informe Final de Tesis cuyo título es:

**Características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú
2022**

Presentado por:

Bach. AARÓN ROJAS SÁNCHEZ

Del nivel de PREGRADO de la Facultad de ODONTOLOGÍA, el resultado obtenido del porcentaje de similitud es el 2% por el cual se otorga el calificativo de:

APROBADO

Según Reglamento de Evaluación de Originalidad

El operador del programa informático evaluador de originalidad, aprueba el Informe Final de tesis por tener un porcentaje de similitud inferior a los límites establecidos por el reglamento.

Para dar fe se adjunta el reporte de similitud con el software de verificación de originalidad **iThenticate**.

Ica, 01 de diciembre de 2025



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Dr. MANUEL RICARDO ROJAS MORALES
Director de la Unidad de Investigación

Abg. YESIKA YANINA HUAMANI VALENCIA
Operador del Programa Informático
Evaluador de Originalidad
Facultad de Odontología

01-12-2025 hrs: 12:17 p.m.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Facultad de Odontología



Características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica
- Perú 2022

LINEA DE INVESTIGACION

Salud pública y conservación del medio ambiente.

INFORME FINAL DE TESIS

AUTOR:

Aarón Rojas Sánchez

ASESOR:

Manuel Ricardo Rojas Morales

Ica – Perú

2026

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a Dios, mi guía y fortaleza en este camino. A mi padre, por su apoyo incondicional, y a mi madre, que desde el cielo me inspira con su amor. A mis hermanos, por su constante aliento; a mi esposa, por su amor y paciencia; y a mi hijo Vasco, quien es mi mayor motivación. Este logro es para ti.

AGRADECIMIENTO

Agradezco profundamente a Dios por darme la fuerza para alcanzar esta meta. A mis padres, por sus enseñanzas y valores. A mis hermanos y esposa, por su apoyo incondicional. A mis profesores y compañeros de estudio, por su guía y colaboración. Gracias a todos por ser parte de este importante capítulo en mi vida.

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE CONTENIDO	iv
ÍNDICE DE TABLAS	vi
ÍNDICE DE FIGURAS	vii
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
I. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Antecedentes:	1
1.2 Realidad problemática:	9
1.3 Justificación e importancia:	10
1.3.1 Justificación:	10
1.4 Objetivos de la investigación	10
1.4.1 Objetivo general:	10
1.4.2 Objetivos específicos:	11
1.5 Capítulos	11
II. ESTRATEGIA METODOLÓGICA	13
2.2 Enfoque de la investigación.	13
2.3 Tipo, nivel y diseño de investigación	13
2.3.1 Tipo de investigación	13
2.3.2 Diseño de investigación	13
2.3.3 Nivel de investigación	13
2.4 Población y muestra	13
2.4.1 Población de estudio	13
2.4.2 Muestra	14
2.5 Técnicas de recolección de datos:	15
2.6 Instrumento de recolección de datos	15
2.7 Variables de investigación.	16
2.7.1 Identificación de las variables	16
III. RESULTADOS	17
3.1. Presentación e interpretación de resultados	17
IV. DISCUSIÓN	26
V. CONCLUSIONES	27
VI. RECOMENDACIONES	28
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	29
VIII. ANEXO	31
ANEXO 1	31

ANEXO 2	32
ANEXO 3	35
ANEXO 4	36

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla N°1: Datos demográficos por edad y sexo de los pacientes atendidos en los consultorios dentales del distrito de Ica</i>	<i>17</i>
<i>Tabla N°2: Tipo de material usado en las prótesis parciales removibles y la presentación de inconvenientes en su uso.</i>	<i>18</i>
<i>Tabla N°3: Arcada dental reemplazada con mayor frecuencia por una prótesis parcial removible y la presentación de inconvenientes en su uso.</i>	<i>19</i>
<i>Tabla N°4: Tiempo de uso e inconvenientes de la prótesis parcial removibles</i>	<i>20</i>
<i>Tabla N°5: Perjuicio que ocasiona el uso de PPR e inconvenientes en su uso.</i>	<i>21</i>
<i>Tabla N°6: Perjuicio funcional en el uso de prótesis parcial removible y los inconvenientes por su uso.</i>	<i>22</i>

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura N°1: Datos demográficos por edad y sexo de los pacientes atendidos en los consultorios dentales del distrito de Ica</i>	<u>17</u>
<i>Figura N°2: Tipo de material usado en las prótesis parciales removibles y la presentación de inconvenientes en su uso.</i>	<u>18</u>
<i>Figura N°3: Arcada dental reemplazada con mayor frecuencia por una prótesis parcial removible y la presentación de inconvenientes en su uso.</i>	<u>19</u>
<i>Figura N°4: Tiempo de uso e inconvenientes de la prótesis parcial removibles</i>	<u>20</u>
<i>Figura N°5: Perjuicio que ocasiona el uso de PPR e inconvenientes en su uso.</i>	<u>21</u>
<i>Figura N°6: Perjuicio funcional en el uso de prótesis parcial removible y los inconvenientes por su uso.</i>	<u>22</u>

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue identificar la relación de las características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de ICA Perú 2022

La metodología fue observacional prospectivo transversal, relacional; el tamaño de la muestra Fue de 64 pacientes Para obtener los resultados se hicieron tablas de contingencia. Para la contrastación de hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica del chi cuadrado.

Los resultados: los que presentaron mayores inconvenientes son la prótesis parcial removible de base metálicas un 46.9 % mientras que lo de acrílico 39.1 %, El 85% presentó inconvenientes en su prótesis, el 68,8 % el tiempo de uso fue mayor de 10 años, El 34 4% presentó aflojamiento en sus prótesis, El 64 1% presentó perjuicio funcional. CONCLUSIONES: Las características del material está asociado a los inconvenientes en el uso de prótesis, las características del perjuicio de uso están asociado a los inconvenientes de uso, las características del perjuicio funcional están asociados a los inconvenientes de uso de la prótesis parcial removible.

Palabras claves: materiales de prótesis parcial, arcada dental remplazada, tiempo de uso, perjuicio de uso, perjuicio funcional.

ABSTRACT

The objective of this study was to identify the relationship between removable partial denture characteristics and drawbacks in use in patients treated in dental offices in the ICA district of Peru.

The methodology was observational, prospective, cross-sectional, relational; the sample size was 64 patients. Contingency tables were created to obtain the results. The nonparametric chi-square test was used to test hypotheses.

The results: those with the greatest drawbacks were metal-based removable partial dentures (46.9%) and acrylic (39.1%). 85% had problems with their prosthesis, 68.8% had been wearing their prosthesis for more than 10 years, 34.4% had loosening of their prosthesis, and 64.1% had functional impairment. CONCLUSIONS: Material characteristics are associated with disadvantages in prosthesis use; characteristics of wear-related harm are associated with wear-related disadvantages; and characteristics of functional harm are associated with wear-related disadvantages of removable partial dentures.

Keywords: . partial prosthesis materials, dental arch replaced, time of use, damage to use, functional damage.

I. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes:

Las prótesis parciales removible (PPR), es uno de los procedimientos considerado el tratamiento más usado para la búsqueda del reemplazo y reconstrucción de los pacientes edéntulos parciales; sin embargo, mientras que estos son usados para sustituir la pérdida de dientes también pueden ocasionar y ser un factor de peligro a sus portadores, entre ellas, se considera la mayor incidencia de presencia de caries, lesiones en el tejido periodontal y el aumento de fuerza y peligro en las piezas pilares. Todas estas lesiones se le acuan a una rutina de higiene deficiente, por la acumulación de placa bacteriana y formación de cálculo dental. Por estos motivos, diversas investigaciones buscan los cambios principales que ocurren con el uso de la prótesis parcial removible y tener mayor información que se apropiada para el conocimiento de los profesionales y los pacientes.

Con el fin de buscar la prevalencia de uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en la comunidad de Sánchez Cerro en la ciudad de Sullana en un centro de salud, se realizó un estudio por Román con un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo de corte transversal, entre sus participantes fueron entre el rango de edad de 25 y 70 años de ambos sexos, en ellos se aplicó un examen físico con el uso del odontograma completa. Entre el resultado se tuvo que de 284 pacientes que acudieron a buscar atención en este centro de salud, un 61,97% contaba con el uso de una prótesis parcial removible dental, en los cuales se indagó, cual fue la causa de su pérdida de dientes en la cual un 67,3% incurrió en el motivo por caries, un 0,7% por presencia de enfermedad periodontal, por traumatismo dentales un 1,4%, y el 29,6% no refieren causa. Así mismo, se le realizó el examen clínico minucioso en los pacientes portadores de PPR y hallar inconvenientes con el uso de esta, en donde el 30,3% tuvo un porcentaje elevado de los pacientes que presentaban gingivitis, mientras que en la presencia de periodontitis en los pacientes que son portadores, con una severidad leve fue en 21,5%, periodontitis moderada lo presentó un 4,6% de los portadores y un 0,4% fue grave. Con respecto, al tiempo de uso de su prótesis, los participantes del estudio manifestaron que el 7,7% usa su prótesis de 1 a 5 años, seguido del 6,7% con el uso de su PPR mayor de 10 años, de un tiempo de 5 a 10 años lo tiene un 4,9% y con uso menor a un año el 4,6%. Para obtener la condición de limpieza de cada participante sobre su PPR, se obtuvo que el 20,1% si realizaba la limpieza de su prótesis, mientras que el 6,3% no lo realiza. Por último, el 17,6% de los portadores mencionan que no se retiran su PPR en la noche, y solo un 8,8% si se retiran su prótesis por la noche. ⁽¹⁾

Hasta el momento, con el uso de la prótesis parcial removible, entre sus portadores hasta en la actualidad se menciona que la mitad de ellos presentan algún problema de funcionalidad de su prótesis, y en su mayoría de los usuarios son adultos y adultos mayores, provocando molestias y

descontento en ellos, por lo cual, se le da un grado de responsabilidad a los profesionales que son los dentistas, ya que ellos pueden provocar algunos errores ya sea en realizar el diagnóstico y en la planificación del tratamiento, este procedimiento se considera desde la toma de modelos de estudios con exactitud, preparación de los pilares, la guía de transferencia de inserción, y brindar una comunicación con el técnico dental, enviar instrucciones escritas sobre el diseño de la prótesis y sus especificaciones, y también la educación con el paciente de la preparación en la cavidad oral y la motivación en lograr el control del biofilm. Con el objetivo de lograr determinar la relación entre el nivel de conocimiento del profesional odontólogo y la frecuencia de errores en la elaboración de la prótesis parcial removible, en el año 2020 en el distrito de Ate Vitarte, se realiza un estudio correlacional, transversal y descriptivo por Yupanqui y Rivera. Esta investigación se conformó por 50 cirujanos dentistas, cuyos resultados se tuvo que el 22% de los dentistas tiene un alto conocimiento sobre el diseño de retenedores y apoyos de la PPR, seguido de un 50% que tiene un conocimiento regular y el 28% que si tiene un buen nivel de conocimiento; con respecto a su conocimiento sobre la estructura metálica de una PPR el 14% tienen un mal conocimiento, el 60% un conocimiento regular y el 30% un buen conocimiento; el conocimiento sobre los conectores mayores y menores el 30% tienen un buen conocimiento, el 52% tiene un conocimiento regular sobre su diseño y el 18% un mal conocimiento. Por otra parte, la información obtenida sobre los errores presente las PPR, el 28% presenta pocos errores en los apoyos y retenedores, el 48% solo a veces presentan estos errores, siendo el 24% que si presenta muchos errores en este diseño de la PPR; los errores en la estructura metálica el 24% presento pocos errores, el 56% menciona ser a veces estos errores y el 20% si presenta múltiples errores en esta estructura. Concluyendo que si existe una correlación significativa sobre las variables estudiadas. ⁽²⁾

Se realizó una investigación por Yero y Pérez entre los pacientes portadores de prótesis parcial removible, fue un estudio descriptivo, observacional con una muestra de 97 pacientes, los cuales fueron mayores de 60 años que acuden a la clínica estomatológica durante el año de 2019 y 2020, se aplicó un cuestionario y luego se realizó un examen clínico de la cavidad oral de manera minuciosa y de la prótesis dental, esto fue llevado a cabo de manera integral en los consultorios odontológicos. Entre los resultados se tuvo que un 66% estuvo conformada por el sexo femenino y un 34% por el sexo masculino, la mayoría de los participantes se encontraba entre el rango de edad de 60 a 69 años, seguido de 37,1% de 70 a 79 años y un 13,4 de mayores de 80 años. Luego se obtuvo durante el examen clínico la presencia de lesiones para protésicas, remarcando que en algunos pacientes se presentó más de una lesión, entre ellas estuvo liderando la estomatitis subprotésica con un 55,6%, seguido de úlceras traumáticas con un 31,9%, con 13,4% se encontró érpulis fisurado, en un 11,3% existe desordenes de la articulación temporomandibular, terminando con 7,2% y 5,1% de creta hipomóvil y alteraciones musculares, respectivamente. Concluyendo

también que el sexo femenino presenta con mayor frecuencia lesiones causadas por el uso de prótesis parcial removible. ⁽³⁾

La prótesis parcial removible cumple diversas funciones, ya no solo ayuda a reemplazar piezas dentarias perdidas, devuelve múltiples funciones como la función masticatoria, la armonía facial, la función de fonación y mejor estética. Entre la búsqueda de los factores que provocan lesiones en la cavidad oral en los pacientes que usan prótesis removible, ya que sabemos que la mucosa oral presenta múltiples respuestas patológicas ante a un peligro o agresor físico, presentando lesiones mucocutáneas, reacciones adversas o factores que muchas veces conllevan a ya no utilizar este tipo de prótesis por los inconvenientes que pueden lograr a presentar sus portadores. Con un estudio de tipo cualitativo, retrospectivo, se obtuvo como resultados que los factores como el sexo, la edad, mala higiene oral y de la PPR, la ausencia de descanso de la mucosa oral de la aparatología protésica, una prótesis mal adaptada, conllevan que exista la aparición de lesiones, siendo las ubicadas en el paladar las más frecuentes, estas son denominadas como estomatitis sub protésica, el cual el factor más importante en influir fue una prótesis desadaptada y la mala higiene. Con respecto, a la edad los jóvenes son los menos afectados probablemente por la capacidad de recuperación y regeneración tisular, en cambio, de un adulto mayor, donde según los cambios fisiológicos como la xerostomía y la presencia de enfermedades sistémicas, el uso de múltiples fármacos y cambios en la estructura ósea, provoca que sea más vulnerable a padecer de lesiones en la mucosa oral. ⁽⁴⁾

Un aspecto considerable es el estudio del tejido periodontal en los pacientes que son portadores de prótesis parcial removible, por ello en Huánuco en el 2020, se realiza esta investigación en un Centro de Salud con el objetivo de lograr determinar el estado del tejido periodontal, una investigación de tipo básico puro, observacional, de corte transversal y prospectivo, entre sus resultados se tuvo que los pacientes portadores de prótesis menor de 4 años en su mayoría presentan un buen estado de tejido de soporte periodontal; sin embargo, los portadores con más de 4 años son los pacientes que si presentan diferentes grados de enfermedad periodontal, entre ellos el sexo femenino fue con un 73% que presento periodontitis en grado 4, el rango de edad más afectado se encontró entre los 58 a 65 años con periodontitis grado 4 en un 80,7%. También se evaluó la extensión de la enfermedad en los pacientes encontrando un 51% con una extensión localizada, un 26% portadores de PPR con una extensión generalizada. Concluyendo que si existe un gran porcentaje en pacientes portadores de prótesis parcial removible que presentan alta prevalencia de enfermedad periodontal viéndose afectados con el tiempo por su uso, al igual que se acompaña por algunos factores como una higiene deficiente de la cavidad oral y de la prótesis misma, así como el error de no retirarse por las noches la PPR. ⁽⁵⁾

El uso de las prótesis removibles en el caso de la parcial puede darse posibles problemas en diferentes etapas desde el momento del diagnóstico y al brindar el tratamiento, sin embargo, los más incómodos se dan en la cavidad oral, por ejemplo en el momento de registrar los tejidos de soporte y preparación de las piezas dentarias, el factor de realizar una oclusión armónica a veces puede llegar a fracasar, el cuidado que se le da a las PPR también es función del profesional informale los métodos de limpieza y cuidado hacia el paciente, otros inconvenientes puede darse como sensibilidad dental en el cuello dentinario, o a la presión ocasionar dolor, ocasionar caries secundaria, llegar a padecer de una enfermedad periodontal y obtener interferencias oclusales. Con respecto a los inconvenientes en mucosa oral, se puede ocasionar en diferentes áreas de fricción de la prótesis úlceras o también estomatitis protésica, así como leucoplasia ocasionada por irritación continua, al encontrarse un reborde alveolar inestable puede ocasionar movimientos horizontales de la prótesis y su base. Otros inconvenientes que suelen ser comunes es dificultad en la deglución por una sobre extensión de las PPR superior en la zona del paladar, en el espacio de piso lingual, en la zona del triángulo retromolar; así mismo, algunos portadores mencionan tener un sabor metálico o sensación de ardor sobre la mucosa oral, presencia de xerostomía o glosodinia, y por último, también puede presentar alteraciones en el habla, alterar la fonética del pacientes o incomodar en el momento de masticar, que puede darse por una mala adaptación de la aparatología, aflojamientos o mala ubicación de los retenedores sobre las piezas pilares. Por tal motivo, se realiza la investigación como objetivo de evaluar el comportamiento de pacientes portadores de una PPR sobre el uso y su higiene de las mismas, donde participaron 81 pacientes, donde la edad más frecuente encontrada fue de 58 años, y pacientes del sexo masculino, al igual que con mayor frecuencia se obtuvo el uso de PPR del maxilar superior, con respecto a la condición de la aparatología se relaciona directamente a los años de uso, y la mayoría mencionan retirarse la prótesis en ningún momento, siendo el 74% de portadores que presentan un mal hábito y comportamiento de higiene y conservación en su prótesis. ⁽⁶⁾

El impacto de la salud bucal sobre la calidad de vida de los pacientes en la actualidad es un tema muy relacionado, ya que influyen tanto en las actividades diarias de los pacientes y su influencia sobre la salud mental de cada uno de ellos. En su mayoría el adulto mayor es el rango de edad que es más vulnerable, según la OMS el adulto mayor se les considera a personas mayores de 60 años en países desarrollados, mientras que en países en vías de desarrollo se considera a los mayores de 65 años, ellos atraviesan diferentes problemas bucales como los es la pérdida de dientes, y esto puede influir en la calidad de vida con el uso de prótesis parcial removible. Se realiza una investigación prospectiva, observacional y de corte transversal, que tuvo 99 participantes pertenecientes al grupo de adultos mayores, ellos fueron seleccionados con un muestreo probabilístico. Para la recolección de información se usó el índice de CPOD, IOHS, escala de estado de prótesis. Entre sus resultados los pacientes adulto mayor un 44% presenta una

salud oral regular, con respecto a la calidad de vida de los participantes un 54,5% fue buena, entre estas dos variables se llegó a la conclusión que si existe una estrecha relación significativa entre los participantes. ⁽⁷⁾

Una de las lesiones más frecuentes en cavidad oral es la estomatitis subprótesis, esta es una lesión de tipo inflamatoria, en la cual se observa clínicamente como una lesión hiperplásica, esta patología puede llegar a afectar diferentes áreas de la cavidad oral como las áreas que sirven de soporte en los pacientes que son edéntulos ya sea parcial o total y utilizan aparatología protésica que pueden ser dentosoportadas o mucosoportadas. Con respecto a su inicio o causa de esta lesión, se asocia a diversos factores, como al uso de materiales dentales y como una reacción alérgica ante ellos como en prótesis de resina acrílica, también se puede atribuir a traumas causados por prótesis mal ajustadas, ya que suelen producir alteración en las glándulas salivales que se encuentran en el paladar, al igual que a una higiene bucal y protésica deficiente, y por último también puede ocurrir algunas infecciones microbianas debajo de las prótesis usadas. Se realizó una investigación para determinar la presencia de estomatitis subprótesis en pacientes portadores de prótesis totales en adultos mayores del albergue de Canevaro en la ciudad de Lima, donde se entrevistó y evaluó a 98 pacientes que usan prótesis dental total, donde resultó que el 100% tiene la presencia de estomatitis subprótesis, el 58,3% fue el grado II más frecuente, seguido de 29,2% con un grado I y de grado III el 12,5%, así mismo, estas lesiones aumentan en los pacientes que llevan usando sus prótesis por más de 5 años, concluyendo que la presencia de estas lesiones se relaciona directamente a las condiciones de conservación de su prótesis y los años de uso de cada una de ellas. ⁽⁸⁾

La presencia de edentulismo en los adultos es más común de lo que se describe, así se piense que en la actualidad existen diversos tratamientos tanto en el campo preventivo y restaurador en la salud bucal, existe gran porcentaje a nivel global que esta sigue afectando a nuestra población, esto está relacionado a factores como el nivel social, el nivel económico, y esto llega a reflejar si nuestros pacientes de jóvenes han llevado una mala rutina de higiene oral y atenciones odontológicas. Sin embargo, los pacientes que tienen la probabilidad de poder recibir tratamiento profesional con su dentista y lograr mejorar su estado rehabilitador en la cavidad oral, se puede realizar diversos tipos de prótesis que estas pueden ser fijas, prótesis removible ya sea parcial o totales e incluso lo que tiene mayor posibilidad económica pueden optar por el uso de implantes que es un tratamiento más costoso. En un estudio que tuvo como objetivo identificar la necesidad y la condición de prótesis dentales en pacientes adultos que acuden a la clínica odontológica de la Universidad Cayetano Heredia, fue un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal y observacional, en la cual se contó con 151 pacientes que van de 18 a 60 años, cuyos resultados te tuvo que un 53% si tenían la necesidad que usar algún tipo de prótesis dental, siendo el 20,5% la que se necesita en el maxilar superior una prótesis parcial removible y así mismo e 27,8% en e

maxilar inferior, también se evaluó que el 12,6% de los participantes ya portaban prótesis, siendo la prótesis fija la más utilizada en la arcada superior en un 6% y un 2% en la arcada inferior con la prótesis parcial removible. Concluyendo que existe una alta necesidad del uso de prótesis dental, sin embargo, existe una baja frecuencia que los adultos la utilicen. ⁽⁹⁾

En un estudio descriptivo de corte transversal donde participaron 43 pacientes que son portadores de prótesis parcial removible, se estudió el estado de sus prótesis, en el cual el 86% pertenecían al sexo femenino y un 14% al masculino, el rango de edad más frecuente fue de 40 a 60 años en un 67,4%, mayores de 60 años en un 25,6% y un 7% en adulto joven de 20 a 40 años; el 37,2% presentaron un muy buen estado de su aparatología, seguido de un 34,9% a un estado regular, un 20,9% un estado bueno y un 7% en un mal estado. Años que llevan usando su prótesis el 55,8% dijo usarla 2 años recién, 3 años un 18,6%, 4 años el 16,3% y más de 5 años el 9,3%. También se evaluó si había una oclusión adecuada, siendo el 65,1% una correcta oclusión y el 34,9% una incorrecta; con respecto a la arcada dentaria donde utilizan su prótesis en el 65,1% es en la superior y el 34,9% en la arcada inferior; a la adaptación de su prótesis un 67,4% menciona si tenerla adaptada y el 32,6% no adaptada. Se presentó en 11,6% una pigmentación protésica y estomatitis subprotésica en un 41,9%. La clase de edentulismo más frecuente fue la clase II con 41,9%, clase III en un 30,2% y Clase I es 25,6%. ⁽¹⁰⁾

En la investigación realizada por Cirilo Jacobo en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza para lograr determinar los factores que influyen en el uso de una PPR, estuvo compuesta por 182 pacientes los cuales usaron y usan prótesis parcial removible, el 75,8% pertenecía al sexo femenino y 24,2% del masculino, los rangos de esta se tuvieron de 40 a 55 años en 25,8%, 56 a 70 años en 59,3% y de 71 a 85 años 14,8%. El 57. % tiene una prótesis de el maxilar superior y el 42,9% prótesis mandibular, el tipo de material usado en su prótesis fue que 52,8% es metálica y el 47,2% es acrílica. Se dividió en 2 grupos en los pacientes que usaban actualmente su prótesis, los cuales el 55,2% presentan inconvenientes en su prótesis entre los más frecuentes fue aflojamiento de su aparatología en un 31,3%, la dificultad en la función masticatoria en 25,8%, dolor durante la masticación en el 14,7%, alteraciones en la fonación un 8,6% y por rotura de sus retenedores 6,7%; y un 44,8% no presenta inconveniente. El otro grupo que no usa actualmente su prótesis menciona que el 84,1% si presenta inconvenientes en su PPR entre los más frecuentes fue alteración para masticar en el 27,3%, por rotura de su base metálica en el 18,2%, por existencia de presiones en la mucosa oral un 18,2%, aflojamiento de su aparatología un 15,9%, por pérdida de sus pilares en 15,9%, presión en sus piezas dentarias el 15,9% y por una estética no buen en el 13,6%; y el 15,9% no presenta inconvenientes. ⁽¹¹⁾

En la conformación de una prótesis parcial removible, este es un procedimiento para lograr la rehabilitación de un edéntulo parcial, resulta ser relativamente económico y rápido de construir

para poder sustituir las piezas dentarias perdidas, como indicamos este procedimiento se realiza en equipo tanto el profesional el cirujano dentista y el técnico dental, ambos deben tener una coordinación y conocimiento necesario sobre el tema para lograr confeccionarla adecuadamente. En la actualidad, este procedimiento muchas veces es realizado de manera inadecuada, y suele ser un caso de negligencia por el odontólogo al dejar que el técnico dental realice el diseño, a esto se le atribuye que más del 50% de los profesionales manifiestan que no conocen como realizar un correcto diseño de una PPR, ocasionando que toda la responsabilidad de realizarla recaiga sobre el técnico y atente contra el bienestar y armonía orofacial de cada uno de los pacientes. Así, se realiza un estudio en búsqueda de comparación de nivel de conocimiento en el diseño de una PPR entre un cirujano dentista y un técnico dental, realizado en la ciudad de Chiclayo, en la cual se entrevistó a 249 odontólogos y a 137 técnicos, teniendo como resultado que el 54,4% de dentistas tiene un nivel de conocimiento malo, el 25,8% un regular conocimiento y el 19,8% un buen conocimiento sobre el diseño de prótesis; en comparación con los técnicos dentales el 73% tiene un conocimiento regular, un 25,5% un mal conocimiento y un 1,5% un buen conocimiento. ⁽¹²⁾

En un estudio de identificaron alteraciones óseas y alteraciones de musculo en pacientes adultos mayores que usan prótesis parcial removible desadaptadas de tipo dentomucosoportadas, se realizó un estudio descriptivo y no experimental, conformada por una muestra de 45 en pacientes que son mayores de 50 años, estos pacientes manifestaron en su entrevista y en el llenado de su cuestionado, así mismo, se les realizo el examen clínico en donde se comprobó que sus prótesis estaban mal adaptadas. Entre los resultados se tuvo que un 71,11% hubo alteración ósea con una disminución del reborde óseo residual en mandíbula, con mayor frecuencia en el sexo masculino en un 75% en pacientes mayores de 71 años. Al evaluar alteraciones musculares, se identificó dificultad al hablar y alteración al masticar con la prótesis puesta en la cavidad oral un 71,11%, en el sexo masculino con 81,25% entre la edad de 50 a 60 años. Concluyendo que los pacientes portadores de PPR, con el pasar del tiempo habrá alteraciones diferentes que pueden ser óseas o musculares, y puede aumentar en severidad, si es que en caso no acudan en el tiempo correcto hacia un especialista para cambiar su aparatología protésica. ⁽¹³⁾

Ywasaki T. realizó una investigación con el objetivo de identificar el nivel de conocimiento sobre el mantenimiento y cuidado de las prótesis parciales removibles en los adultos mayores en la clínica de odontología ULADECH católica en la ciudad de Chimbote, departamento de Ancash en el año 2019. La metodología utilizada fue un estudio descriptivo, enfoque cuantitativo, prospectivo, de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 70 adultos mayores que utilizan prótesis parcial removible, fue un muestreo por conveniencia, como instrumento se utilizó el cuestionario que constaba de 22 preguntas. Entre los resultados se obtuvo que el 58% de los participantes tienen un nivel de conocimiento regular en el mantenimiento y cuidado de las prótesis parciales removibles, un 26% tuvo un nivel de conocimiento malo. El sexo femenino

tuvo un 21.5% conocimiento malo y el rango de edad de 70 a 79 años fue el 18.6% presentaron un nivel de conocimiento malo. En el aspecto de mantenimiento, el sexo femenino tuvo un 20.1% tuvo un nivel de conocimiento malo. Y la edad fue 60 a 69 años el que presentó un conocimiento regular en un 15.7%. Llegando a la conclusión que el nivel de conocimiento de los adultos mayores que se atendieron en la clínica odontológica ULDECH católica es regular y mala. ⁽¹⁴⁾

Quito J. en su estudio realizado con el objetivo de determinar una asociación entre el nivel socioeconómico y la necesidad de usar prótesis dental en pacientes adultos que fueron atendidos en el servicio de estomatología del centro médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara en el año 2023. La metodología usada fue un estudio descriptivo, correlacional, de corte transversal y observacional, los pacientes atendidos entre mayo y julio fueron 237 adultos. Entre sus resultados se encontró que el 60.8% tienen necesidad de utilizar en prótesis removible en la arcada inferior, predominó que hay necesidad de usar prótesis multiunitaria en ambas arcadas. Con respecto al nivel socioeconómico fue medio en un 69.6%, los participantes que necesitan usar prótesis predominó en el sexo masculino en un 39.2% y el rango de edad predomina entre los 30 a 59 años. Llegando a la conclusión no hubo asociación significativa entre el nivel socioeconómico y la necesidad de usar prótesis dental en los pacientes atendidos. ⁽¹⁵⁾

Atara G. en su investigación Relación entre la frecuencia del Edentulismo Parcial según la clasificación de Kennedy y el Nivel de la Satisfacción de los pacientes portadores de Prótesis parciales removibles en la Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa El propósito de esta investigación fue determinar frecuencia del edentulismo parcial. En pacientes adultos y conocer su nivel de satisfacción en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica Esta investigación se realizó con una metodología. Descriptivo, Observacional, transversal y prospectivo Además refiere para el análisis de la contrastación de hipótesis utilizaron la prueba estadística no paramétrica del chi cuadrado. Se utilizó un cuestionario. OHIP. Edent 19 (Oral Health Impact Profile). Los resultados obtenidos fueron de acuerdo a la clasificación de Keny clase II Y un nivel de satisfacción regular ⁽¹⁶⁾.

Cárdenas G. en su investigación el nivel de satisfacción de pacientes rehabilitados con prótesis parcial removible soportada sobre ataches, en una Clínica Odontológica Privada - Lima 2021. El diseño de investigación fue. Observacional Descriptivo. De corte transversal El recojo de la información fue a través de un cuestionario. El tipo de prótesis removible usado fue acrílico - metálico con una satisfacción alta, pero con ataches ⁽¹⁷⁾.

Colonia S. en su trabajo nivel de satisfacción del paciente adulto rehabilitado con prótesis parcial removible y prótesis total en la Clínica Integral I y II de la ULADECH Católica, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash, año 2019, cuyo propósito de esta investigación fue determinar el nivel de satisfacción del paciente adulto con prótesis parcial

removible, La metodología seguida con tipo investigación fue observacional, prospectiva transversal descriptivo. El autor concluye porque la satisfacción es regular en los pacientes atendidos en. Universidad Católica los ángeles de Chimbote. ⁽¹⁸⁾

Cruz P. en su trabajo de investigación satisfacción estética según el tipo de prótesis dental en los pacientes rehabilitados en la clínica integral del adulto II de la universidad Alas Peruanas 2017, cuyo propósito fue relacionado el nivel de satisfacción estética referente a la prótesis dental La investigación fue de tipo observacional transversal descriptiva. El autor concluye que existe una satisfacción estética en los pacientes rehabilitados con prótesis La dimensión afectada es la psicológica. ⁽¹⁹⁾

Rivera DG. En su investigación grado de satisfacción de los tratamientos protésicos removibles en pacientes parcialmente desdentados, servicio de odontología del Hospital Daniel Alcides Carrión Pasco 2016. La presente investigación se realizó con la finalidad de. determinar el grado de satisfacción en los tratamientos de. prótesis parcial removible. Esta investigación se enmarcó en una investigación descriptiva. Observacional de corte transversal el muestreo fue de tipo no probabilístico. Y finalmente se concluyó que el grado de satisfacción más frecuente es satisfecho con su tratamiento protésico asimismo el grado de satisfacción varía de acuerdo al tipo de prótesis ⁽²⁰⁾

1.2 Realidad problemática:

Problema general

¿Cuál es la relación de las características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022??

Problemas específicos

- ¿Cuál es la asociación de las características del material usado en la prótesis parcial removible y los Inconvenientes en el uso prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022?
- ¿Cuál es la asociación de las características de la Arcada dental más frecuente que es reemplazada y los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible y en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022?
- ¿Cuáles la asociación de las características del tiempo de uso y los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022?

- ¿Cuál es la asociación de las características del perjuicio de uso y los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022?
- ¿Cuál es la asociación de la relación de las características del perjuicio funcional y los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022?

1.3 Justificación e importancia:

1.3.1 Justificación:

Nuestra investigación reside en la importancia de obtener datos reales y locales sobre nuestros pacientes atendidos en los consultorios odontológicos que son portadores de una prótesis parcial removible, ya que consideramos que es necesario evaluar el uso, las condiciones y los inconvenientes de cada una de ellas porque las consecuencias y la manera de cómo repercute en los pacientes al provocar diferentes alteraciones ya sea ósea, musculares o alterar funciones básicas como la masticación, fonación y estética puede conllevar severas lesiones, por lo tanto, se entrevistará a pacientes adultos que en su mayoría llevan años padeciendo alguna lesión o molestia al usar una prótesis dental, asistiendo a diferentes profesionales pro el descontento y malos tratamientos anteriores.

Este informa logrará contribuir en presentar datos que representen a nuestra comunidad, y poder brindar un diagnóstico y un tratamiento a un paciente que es edéntulo parcialmente, este deber recibir un tratamiento adecuado y verificar los inconvenientes que viene presentando sobre el uso de su aparatología protésica de manera rápida y oportuna, realizada de manera multidisciplinaria en coordinación del profesional como el cirujano dentista y el técnico dental, quienes son los encargados de realizar un procedimiento adecuado y sin defectos. Ya que hasta la actualidad sigue existiendo confusión con respecto de lograr diagnosticar de manera correcta y realizar un plan de trabajo con un diseño correcto de una PPR y luego poder cuantificar los efectos en cada uno de nuestros pacientes.

Así mismo, será de gran utilidad a sus lectores como profesionales de salud o futuros odontólogos, para que puedan acceder a resultados que sirvan como base a futuros estudios de investigación.

1.4 Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general:

Identificar la relación de las características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.

1.4.2 Objetivos específicos:

- Identificar la asociación de las características del material usado en la prótesis parcial removible y los Inconvenientes en el uso prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.
- Identificar la asociación de las características de la Arcada dental más frecuente que es reemplazada y los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible y en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.
- Identificar la asociación de las características del tiempo de uso y los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.
- Identificar la asociación de las características del perjuicio de uso y los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.
- Identificar la relación de las características del perjuicio funcional y los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.

1.5 Capítulos

Capítulo I.- En este capítulo desarrollamos los antecedentes la realidad problemática la justificación y los objetivos de esta investigación

Capitulo II.- En la metodología desarrollamos el tipo de investigación nivel de investigación diseño de investigación además de la población la muestra el cálculo de la muestra y el tipo de muestreo

Capitulo III.- En los resultados desarrollamos las tablas de contingencia de las variables de las características de la prótesis imparcial removible y los inconvenientes además desarrollamos la prueba de hipótesis del chip cuadrado para realizar la contrastación

Capitulo IV.- La discusión lo realizamos con un con todos los antecedentes hicimos la similitud y las diferencias que podíamos encontrar con algunos autores

Capitulo V.- Las conclusiones fueron productos de toda la contrastación de hipótesis

Capítulo VI. - La recomendación es lo realizamos producto de haber logrado cada una de las conclusiones

Capitulo VII.- Con la referencia bibliográfica utilizamos la modalidad de Vancouver

Capitulo VIII.- En los anexos acompañamos la el consentimiento informado el instrumento de investigación la base de datos y la vista de variables que hemos utilizado en el desarrollo de esta investigación

II. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

2.2 Enfoque de la investigación.

Investigación cuantitativa,

2.3 Tipo, nivel y diseño de investigación

2.3.1 Tipo de investigación

- Según la intervención del investigador:
Observacional, el acto en el presente trabajo de investigación realizará un análisis de cada una de las variables con el proceso de observación sin realizar alguna intervención en la variable.
- Según la planificación de la toma de datos:
Prospectivo, luego de haber realizado el proyecto de investigación, es cuando se identifica al sujeto en nuestra muestra y se da la evaluación de las variables, luego que el proyecto sea aprobado.
- Según el número de ocasiones en que se mide la variable:
Transversal, la exposición y evaluación de las variables será realizada en una sola ocasión.
- Según el número de muestras a estudiar:
Descriptivo, en este estudio de investigación se conocerá las características específicas que representan a las variables, donde se muestra su presencia en un determinado grupo humano y en un lugar geográfico en común.
Un estudio descriptivo analiza cuidadosamente los detalles de las muestras con criterio y pertinencia para lograr evidenciar una explicación adecuada del contenido.

2.3.2 Diseño de investigación

Transeccional, relaciona

2.3.3 Nivel de investigación

Relacional

2.4 Población y muestra

2.4.1 Población de estudio

Estará conformada por todos los pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022

La población es el conjunto de casos o sujetos que integran o forman parte de alguna característica en común y que comparten un espacio geográfico que ya se encuentra determinado. En algunos

estudios, no se logra estudiar o analizar a toda una población, por lo tanto, se decide realizar alguna técnica de muestreo para lograr obtener una muestra que sea significativa.

2.4.2 Muestra

-TIPO DE MUESTRA:


La muestra será no probabilística sin cálculo alguno.


Este tipo de muestreo se realizó para la selección de casos o sujetos que participaran en el estudio de investigación, dependiendo de ciertas características y criterios necesarios que identifica el autor y considera necesario.

Sin embargo, debido que este tipo de muestreo no se ajusta a un fundamento de cálculo o algún fundamento probabilístico, muchas veces no dan certeza que cada uno de los sujetos representen una población blanca.

-TAMAÑO DE MUESTRA:

El tamaño estuvo conformado por 64 pacientes que sean portadores de prótesis parcial removible atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.





MUESTREO Y TIPO DE MUESTREO:

El muestreo será de tipo no probabilístico intencional bola de nieve.

Tamaño de muestra:

El tamaño estuvo conformado por 64 pacientes que sean portadores de prótesis parcial removible atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022

Para el cálculo de la muestra se tomó en cuenta los siguientes datos:

2.5 Técnicas de recolección de datos:

La técnica que se utilizó para obtener la información requerida de la población fue un cuestionario que se aplicó a los pacientes que son portadores de prótesis parcial removible atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica.

2.6 Instrumento de recolección de datos

Se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas de caracterización de prótesis parcial removibles previa validación.

Del mismo modo para la variable inconvenientes en el uso de una prótesis parcial removibles se desarrolló un cuestionario que contenía preguntas cerradas.

Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de resultados. Los datos fueron representados con los códigos establecidos, se utilizará la técnica analítica para encontrar los resultados y estos resultados se dieron en distribuciones de frecuencias con tablas de doble

entrada además de los gráficos correspondientes mediante el software de análisis estadístico en el programa SPSS versión 26 para la comprobación de la hipótesis usamos la prueba estadística no paramétrica del chi cuadrado.

2.7 Variables de investigación.

2.7.1 Identificación de las variables

Características de la prótesis parcial removible

- Material usado
- Arcada dental reemplazada
- Años de uso de prótesis
- Inconvenientes por uso de prótesis parcial removible
- Inconvenientes del perjuicio funcional que ocasionan el uso prótesis parcial removible

III. RESULTADOS


3.1 Presentación e interpretación de resultados

Tabla N°1: Datos demográficos por edad y sexo de los pacientes atendidos en los consultorios dentales del distrito de Ica

		Sexo		Total
		Masculino	Femenino	
Edad de los pacientes	32 a 56 años	15	11	26
		23.4%	17.2%	40.6%
	57 a 59 años	7	13	20
		10.9%	20.3%	31.3%
	> 60 años	12	6	18
		18.8%	9.4%	28.1%
Total		34	30	64
		53.1%	46.9%	100.0%

Fuente: información obtenida y elaborado por el autor

Figura N°1: Datos demográficos por edad y sexo de los pacientes atendidos en los consultorios dentales del distrito de Ica



Fuente: información obtenida y elaborado por el autor


Entre los datos demográficos la proporción de los pacientes atendidos en género es similar teniendo 53.1% del sexo masculino y 46.9% del sexo femenino, el rango de edad que se vio con más frecuencia fue de 32 a 56 años en un 40.6%

Tabla N°2: Tipo de material usado en las prótesis parciales removibles y la presentación de inconvenientes en su uso.

		Inconvenientes		Total
		Si	No	
Material usado en la prótesis parcial removible	Con base metálica	30	7	37
		46.9%	10.9%	57.8%
	Acrílica	25	2	27
		39.1%	3.1%	42.2%
Total		55	9	64
		85.9%	14.1%	100.0%

Fuente: información obtenida y elaborado por el autor

Figura N°2: Tipo de material usado en las prótesis parciales removibles y la presentación de inconvenientes en su uso.



Fuente: información obtenida y elaborado por el autor


El material usado en la prótesis parcial removible que presentan mayores inconvenientes son con base metálica 46.9%, mientras que la de material acrílico presenta inconvenientes en un 39.1%.

Tabla N°3: Arcada dental reemplazada con mayor frecuencia por una prótesis parcial removible y la presentación de inconvenientes en su uso.

		Inconvenientes		Total
		Si	No	
Arcada dental más frecuente que es reemplazada por PPR	Ambos maxilares	24	7	31
		37.5%	10.9%	48.4%
	Maxilar superior	11	0	11
		17.2%	0.0%	17.2%
	Maxilar inferior	20	2	22
		31.3%	3.1%	34.4%
Total		55	9	64
		85.9%	14.1%	100.0%

Fuente: información obtenida y elaborado por el autor

Figura N°3: Arcada dental reemplazada con mayor frecuencia por una prótesis parcial removible y la presentación de inconvenientes en su uso.



Fuente: información obtenida y elaborado por el autor


Existe una gran proporción de los pacientes atendidos que presentan inconvenientes en su PPR 85.9%, teniendo que un 37.5% se presentan en ambos maxilares, seguido por el maxilar inferior 31.3%.

Tabla N°4: Tiempo de uso e inconvenientes de la prótesis parcial removibles

		Inconvenientes		Total
		Si	No	
Tiempo de uso de prótesis parcial removible	< 5 años	6	5	11
		9.4%	7.8%	17.2%
	5-10 años	5	4	9
		7.8%	6.3%	14.1%
	> 10 años	44	0	44
		68.8%	0.0%	68.8%
Total		55	9	64
		85.9%	14.1%	100.0%

Fuente: información obtenida y elaborado por el autor

Figura N°4: Tiempo de uso e inconvenientes de la prótesis parcial removibles



Fuente: información obtenida y elaborado por el autor


El tiempo de uso de la prótesis parcial removible > 10 años presentó mayores inconvenientes 68.8%, sin embargo, existe una un 9.4% que su tiempo de uso es < 5 años que también los presenta.

Tabla N°5: Perjuicio que ocasiona el uso de PPR e inconvenientes en su uso.

		Inconvenientes		Total
		Si	No	
Perjuicio que ocasionan el uso prótesis parcial removible	Problemas dentales	7	0	7
		10.9%	0.0%	10.9%
	Problemas en la prótesis removible	9	0	9
		14.1%	0.0%	14.1%
	Alteración en la masticación y deglución	17	0	17
		26.6%	0.0%	26.6%
	Aflojamiento de la PPR	22	0	22
		34.4%	0.0%	34.4%
Ninguno	0	9	9	
	0.0%	14.1%	14.1%	
Total		55	9	64
		85.9%	14.1%	100.0%

Fuente: información obtenida y elaborado por el autor

Figura N°5: Perjuicio que ocasiona el uso de PPR e inconvenientes en su uso.



Fuente: información obtenida y elaborado por el autor


Los inconvenientes que se presentaron con mayor frecuencia fue el aflojamiento de la prótesis parcial removible 34.4%, seguido de la alteración en la masticación y deglución 26.6%.

Tabla N°6: Perjuicio funcional en el uso de prótesis parcial removible y los inconvenientes por su uso.

		Inconvenientes		Total
		Si	No	
Perjuicios funcionales en el uso de prótesis parcial removible	Masticación	41	0	41
		64.1%	0.0%	64.1%
	Estética	14	0	14
		21.9%	0.0%	21.9%
	Ninguno	0	9	9
		0.0%	14.1%	14.1%
Total		55	9	64
		85.9%	14.1%	100.0%

Fuente: información obtenida y elaborado por el autor

Figura N°6: Perjuicio funcional en el uso de prótesis parcial removible y los inconvenientes por su uso.



Fuente: información obtenida y elaborado por el autor

El perjuicio funcional causado por los inconvenientes que presentan las prótesis parciales removibles fue con mayor proporción la masticación 64.1%, seguido de la estética en un 21.9%. Sin embargo, un 14.1% consideró no presentar inconveniente con el uso de su prótesis.

Contrastación de hipótesis general

H₀.- Las características del material usado en la prótesis parcial removible no está asociado a los inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.

H₁.- Las características del material usado en la prótesis parcial removible está asociado a los inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.

Chi-cuadrado de Pearson	64,000 ^a	11	,000
N de casos válidos	64		

Como la prueba arroja un valor P = 0.00 calculado y es menor que 0.05 valor de la table entonces aceptamos la hipótesis alterna.

➤ Contrastación de hipótesis especifica 1

H₀.- Las características del material usado en la prótesis parcial removible no está asociado a los Inconvenientes en el uso prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.del distrito de Ica - Perú 2022.

H₁.- las características del material usado en la prótesis parcial removible está asociado los Inconvenientes en el uso prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.

	Valor	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	1,712 ^a	0.191
N de casos válidos	64	

Como la prueba arroja un valor P de 0.191 y es mayor que 0.05 entonces aceptamos la hipótesis nula.

➤ Contrastación de hipótesis específica 2

H₀.- Las características de la Arcada dental más frecuente que es reemplazada no está asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible y en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.

H₁.- Las características de la Arcada dental más frecuente que es reemplazada está asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible y en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.

	Valor	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	4,111 ^a	0.128
N de casos válidos	64	

Como la prueba arroja un valor P de 0.128 y es mayor que 0.05 entonces aceptamos la hipótesis nula.

➤ Contrastación de hipótesis específica 3

H₀.- Las características del tiempo de uso no está asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.

H₁.- Las características del tiempo de uso está asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.

	Valor	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	23,044 ^a	0.000
N de casos válidos	64	

Como la prueba arroja un valor P de 0.000 y es menor que 0.05 entonces aceptamos la hipótesis alterna.

➤ Contratación de hipótesis específica 4

H₀.- Las características del perjuicio de uso no está asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.

H₁.- Las características del perjuicio de uso está asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.

	Valor	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	64,000 ^a	0.000
N de casos válidos	64	

Como la prueba arroja un valor P de 0.000 y es menor que 0.05 entonces aceptamos la hipótesis alterna.

➤ Contratación de hipótesis específica 5

H₀.- las características del perjuicio funcional no están asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.

H₁.- las características del perjuicio funcional están asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.

	Valor	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	64,000 ^a	0.000
N de casos válidos	64	

Como la prueba arroja un valor P de 0.000 y es menor que 0.05 entonces aceptamos la hipótesis alterna.

IV. DISCUSIÓN

A partir de los hallazgos encontrados las características del material usado en la prótesis parcial removible están asociado a los inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica concordamos con las investigaciones realizadas por Rivera J, Yupanqui R.⁽²⁾ Vargas K.⁽⁷⁾ Laguna M.⁽⁸⁾ mantiene una similitud con lo encontrado por Colonia S.⁽¹⁸⁾

Los hallazgos de esta investigación es que las características del material usado en la prótesis parcial removible no están asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica no coincidimos con el hallazgo de Rivera D.⁽²⁰⁾ sobre los inconvenientes porque depende del tipo de prótesis.

Otros hallazgos encontrados fue que Las características de la Arcada dental más frecuente que es reemplazada no está asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible y en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica coincidiendo con los hallado por Gonzalo H.⁽⁴⁾ Cárdenas G.⁽¹⁷⁾

Otro hallazgo fue Las características del tiempo de uso está asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica coincidiendo con lo hallado por Acosta F.⁽⁵⁾ Carlosama J.⁽⁶⁾ Laguna M.⁽⁸⁾ Saquipulla J, Sánchez D.⁽¹⁰⁾ Encontramos diferencias en el tiempo de uso con Roman H.⁽¹⁾

Los hallazgos encontrados en esta investigación fue que las características del perjuicio de uso están asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica coincidiendo con los hallado Rivera J, Yupanqui R.⁽²⁾ Yero I, Pérez L, Fernández J.⁽³⁾ Saquipulla J,⁽¹¹⁾

Los hallazgos encontrados en esta investigación fue que las características del perjuicio funcional están asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica coincidiendo con Cirilo J.⁽¹¹⁾ Deliso D, Diaz A.⁽¹³⁾ Cruz P.⁽¹⁹⁾.

V. CONCLUSIONES

- 1.- Si existe relación de las características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.
- 2.-Las características del material usado en la prótesis parcial removible está asociado a los inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.
- 3.- Las características de la Arcada dental más frecuente que es reemplazada no está asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible y en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.
- 4.- Las características del tiempo de uso está asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.
- 5.- Las características del perjuicio de uso está asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.
- 6.- Las características del perjuicio funcional están asociado a los Inconvenientes en el uso de prótesis parcial removible en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022.

VI. RECOMENDACIONES

- 1.- Actualizar los conocimientos de las características de los materiales dentales usados en prótesis parcial removible, realizar investigaciones de las características de los materiales usados en prótesis parcial removible.
- 2.- Las instituciones académicas deben de preparar a la población sobre el tiempo de uso de la prótesis parcial removible, indicando el tiempo de uso razonable.
- 3.- Estos conocimientos deben ser instaurados en los programas de salud en el más breve plazo.
- 4.- Ampliar los conocimientos de perjuicio de uso (problemas con los pilares dentales, aflojamiento de la prótesis parcial removible)
- 5.- Ampliar los conocimientos de los perjuicios funcionales (masticación, estética)
- 6.- Verificar por parte del odontólogo que los aparatos protésicos cumplan con los parámetros de funcionabilidad y preservación de los tejidos periodontales cuando son instalados en la cavidad bucal.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Roman H. Prevalencia de pacientes de prótesis parcial removible atendidos en centro de salud comunidad salusable 2020. Sánchez Cerro. Sullana. 2021;
2. Rivera J, Yupanqui R. Nivel de conocimiento y frecuencia de errores en el diseño de protesis parcial removible en odontólogos del distrito de Ate Vitarte, 2020. Uladech Católica [Internet]. 2015;15. Available from: http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1536/ATENCION_ODONTOLOGICA_DESARROLLO_DENTAL_CANTARO_SHUAN_FRANK_JHORDY.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. Yero I, Pérez L, Fernández J. Lesiones paraprotésicas en pacientes geriátricos portadores de prótesis removibles. 2021;(4):1–8.
4. Gonzalo H. Factores Que Provocan Lesiones Orales En Pacientes Portadores De Prótesis Removible. 2021;
5. Acosta F. Estado periodontal en pacientes portadores de prótesis parcial removible que acuden al servicio de odontología del Centro de Salud Ambo - Huánuco 2020. 2021. 335 p.
6. Carlosama J. Comportamiento , uso e higiene en pacientes portadores de prótesis bucales. Unidad de atención odontológica UNACH. 2020;
7. Vargas K. Calidad de vida y salud bucal en usuarios de prótesis dental removible del Centro Integral del Adulto Mayor en Lima 2018. 2018; Available from: http://repositorio.uwiener.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/123456789/2875/TESIS_Vargas_Karen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
8. Laguna M. Presencia d estomatitis subprotésica en adultos mayores portadores de prótesis total del albergue de Canevaro, Lima -2018". 2019; Available from: http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/956/ESPECIALIDAD_Montero_Crisologo%2C_Diana_Carolina.pdf?sequence=4&isAllowed=y
9. Peralta F. Necesidad y situación de prótesis que acuden a La Clínica Dental Docente De La UPCH de julio a setiembre en el año 2015. Fac Estomatol. 2017;
10. Saquipulla J, Sánchez D. Estado de las prótesis parciales removibles realizadas en los pacientes atendidos en la Facultad de odontología de la Universidad de Cuenca en el periodo 2012 -2015. 2017; Available from: <https://www.ucuenca.edu.ec/171-cat-recursos-servicios/cat-biblioteca/1557-historia>
11. Cirilo J. Factores que influyen en el uso de prótesis parcial removible en pacientes del servicio de estomatología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza , 2017. 2017;
12. Villegas R. Comparación del nivel de conocimiento sobre el diseño de prótesis parcial removible entre odontólogos y técnicos dentales de la ciudad de Chiclayo, Agosto - Noviembre 2016. 2017;1–84.

13. Deliso D, Diaz A. Alteraciones óseas y musculares en los adultos mayores portadores de prótesis parcial removibles dentomucosoportadas mal adaptadas. *Gospod Mater i Logistyka*. 2013;26(4):185–97.
14. Ywasaki Y. Nivel de conocimiento sobre el cuidado y mantenimiento de prótesis removible de adultos mayores atendidos en la clínica odontológica ULADECH Católica, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash, 2019 [Internet]. Tesis. 2023. 107 p. Available from: file:///C:/Users/MARIANA/Documents/1ACTITUDES_ADOLESCENTES_JIMENEZ_PENA_YESSENIA_MARIBEL.pdf
15. Quito J. Asociación entre el nivel socioeconómico y la necesidad de prótesis dental en adultos atendidos en el departamento de estomatología del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távora” en 2023. 2023;
16. Atarama Gutiérrez ME. Relación entre la frecuencia del Edentulismo Parcial según la clasificación de Kennedy y el Nivel de la Satisfacción de los pacientes portadores de Prótesis parciales removibles en la Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2016. 2017.
17. Cárdenas G. Nivel de satisfacción de pacientes rehabilitados con prótesis parcial removible soportada sobre ataches, en una Clínica Odontológica Privada - Lima 2021.
18. Colonia S. Nivel de satisfacción del paciente adulto rehabilitado con prótesis parcial removible y prótesis total en la Clínica Integral I y II de la ULADECH Católica, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash, año 2019.
19. Cruz P. Satisfacción estética según el tipo de prótesis dental en los pacientes rehabilitados en la clínica integral del adulto II de la universidad Alas Peruanas 2017
20. Rivera DG. Grado de satisfacción de los tratamientos protésicos removibles en pacientes parcialmente desdentados, servicio de odontología del Hospital Daniel Alcides Carrión Pasco 2016.

ANEXO 2

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RECOLECCION DE DATOS

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

“Características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica – Perú 2022”

Fecha: _____

Yo, _____ identificado (a) con el N° de DNI _____, actuando en mi nombre y habiéndome informado sobre los detalles, los objetivos y alcances del estudio de investigación antes mencionado, acepto participar de manera libre y voluntaria como participante en el contexto de recolección de datos.

Accedo a que se me realice el examen necesario y estudios que se me indiquen para ser parte del proceso.

FIRMA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

“Características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica – Perú 2022”

Investigador: Bachiller en Odontología Aarón Rojas Sánchez

Asesor: Dr. Manuel Ricardo Rojas Morales

INTRODUCCIÓN:

Lo estoy invitando a participar del estudio de investigación para Optar el Título de Cirujano Dentista llamado: “Características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica – Perú 2022”. Este es un estudio desarrollado por Bachiller en Odontología Aarón Rojas Sánchez, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.

MOLESTIAS O RIESGOS:

No existe ninguna molestia o riesgo mínimo al participar en este trabajo de investigación. Usted es libre de aceptar o de no aceptar.

BENEFICIOS:

No existe beneficio directo para usted por participar de este estudio. Sin embargo, se le informará de manera personal y confidencial de algún resultado que se crea conveniente que usted tenga conocimiento. Los resultados también serán archivados en las historias clínicas de cada paciente y de ser el caso se le recomendará para que acuda a su médico especialista tratante.

COSTOS E INCENTIVOS:

Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio, su participación no le generará ningún costo.

CONFIDENCIALIDAD:

La investigadora registrará su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados en una revista científica, no se mostrará ningún dato que permita la identificación de las personas que participan en este estudio. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento.

DERECHOS DEL PACIENTE:

Si usted decide participar en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier momento, o no participar de una parte del estudio sin perjuicio alguno.

CONSENTIMIENTO:

Acepto voluntariamente participar en este estudio, he comprendido perfectamente la información que se me ha brindado sobre las cosas que van a suceder si participo en el proyecto, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento.

Firma y Huella del Participante

Nombre:

DNI:

Fecha:

Firma y Huella del Investigador

Nombre:

DNI:

Fecha

ANEXO 3

Base de datos


	VAR00001	sexo	edad	inconvenientes	material_ppr	Arcada	AÑOS_USO	tipo_incov	superar	hipotesis
36	36,00	Femenino	32	Si	Acrílica	Ambos ma...	> 10 años	Aflojamient...	Masticación	15,00
37	37,00	Femenino	32	Si	Acrílica	Ambos ma...	> 10 años	Aflojamient...	Masticación	15,00
38	38,00	Femenino	32	Si	Acrílica	Ambos ma...	> 10 años	Aflojamient...	Masticación	15,00
39	39,00	Femenino	32	Si	Acrílica	Ambos ma...	> 10 años	Aflojamient...	Masticación	15,00
40	40,00	Masculino	57	Si	Acrílica	Maxilar sup...	< 5 años	Aflojamient...	Masticación	14,00
41	41,00	Masculino	57	Si	Acrílica	Ambos ma...	> 10 años	Aflojamient...	Masticación	15,00
42	42,00	Masculino	57	Si	Con base metálica	Maxilar sup...	> 10 años	Aflojamient...	Masticación	15,00
43	43,00	Femenino	58	Si	Acrílica	Ambos ma...	5-10 años	Aflojamient...	Masticación	14,00
44	44,00	Femenino	58	Si	Acrílica	Ambos ma...	5-10 años	Aflojamient...	Masticación	14,00
45	45,00	Femenino	58	Si	Con base metálica	Ambos ma...	5-10 años	Aflojamient...	Masticación	13,00
46	46,00	Femenino	58	Si	Acrílica	Ambos ma...	5-10 años	Aflojamient...	Masticación	14,00
47	47,00	Femenino	58	Si	Acrílica	Ambos ma...	5-10 años	Aflojamient...	Masticación	14,00
48	48,00	Masculino	59	Si	Con base metálica	Ambos ma...	> 10 años	Aflojamient...	Estética	15,00
49	49,00	Masculino	59	Si	Con base metálica	Ambos ma...	> 10 años	Aflojamient...	Estética	15,00
50	50,00	Masculino	59	Si	Con base metálica	Ambos ma...	> 10 años	Aflojamient...	Estética	15,00
51	51,00	Masculino	59	Si	Con base metálica	Ambos ma...	> 10 años	Aflojamient...	Estética	15,00
52	52,00	Masculino	72	Si	Con base metálica	Maxilar infe...	> 10 años	Aflojamient...	Masticación	16,00
53	53,00	Masculino	72	Si	Con base metálica	Maxilar infe...	> 10 años	Aflojamient...	Masticación	16,00
54	54,00	Masculino	72	Si	Con base metálica	Maxilar infe...	> 10 años	Aflojamient...	Masticación	16,00
55	55,00	Masculino	72	Si	Con base metálica	Maxilar infe...	> 10 años	Aflojamient...	Masticación	16,00
56	56,00	Masculino	47	No	Acrílica	Maxilar infe...	< 5 años	Ninguno	Ninguno	20,00
57	57,00	Femenino	52	No	Con base metálica	Maxilar infe...	< 5 años	Ninguno	Ninguno	19,00
58	58,00	Femenino	52	No	Acrílica	Ambos ma...	< 5 años	Ninguno	Ninguno	18,00
59	59,00	Femenino	52	No	Con base metálica	Ambos ma...	< 5 años	Ninguno	Ninguno	17,00

Variables

	Nombre	Tipo	Anchura	Decimales	Etiqueta	Valores	Perdidos	Columnas	Alineación	Medida	Rol
1	VAR00001	Número	8	2		Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
2	sexo	Número	8	0	Sexo	{1, Masculin...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
3	edad	Número	8	0	edad de los pacientes atendidos en consultorios...	Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Escala	Entrada
4	inconvenientes	Número	8	0	Inconvenientes	{1, Si}...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
5	material_ppr	Número	8	0	Material usado en las prótesis parcial removible ...	{1, Con bas...	Ninguna	13	Derecha	Nominal	Entrada
6	Arcada	Número	8	2	Arcada dental más frecuente que es reemplazad...	{1,00, Ambo...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
7	AÑOS_USO	Número	8	0	Tiempo de uso de prótesis parcial removible en ...	{1, < 5 años}...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
8	tipo_incov	Número	8	0	Perjuicio que ocasionan el uso prótesis parcial r...	{1, Problem...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
9	superar	Número	8	0	perjuicio funcionales en el uso de prótesis parci...	{1, Masticac...	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
10	hipotesis	Número	8	2		Ninguna	Ninguna	11	Derecha	Nominal	Entrada
11											

ANEXO 4

EVIDENCIA FOTOGRÁFICAS



“Características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022”

Investigador: Bachiller en Odontología Aaron Rojas Sánchez
 Asesor: Dr. Manuel Ricardo Rojas Morales

INTRODUCCIÓN: Lo estoy invitando a participar del estudio de investigación para Optar el Título de Cirujano Dentista llamado: “Características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022”. Este es un estudio desarrollado por Bachiller en Odontología Aaron Rojas Sánchez, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.

MOLESTIAS O RIESGOS: No existe ninguna molestia o riesgo mínimo al participar en este trabajo de investigación. Usted es libre de aceptar o de no aceptar.

BENEFICIOS: No existe beneficio directo para usted por participar de este estudio. Sin embargo, se le informará de manera personal y confidencial de algún resultado que se crea conveniente que usted tenga conocimiento. Los resultados también serán archivados en las historias clínicas de cada paciente y de ser el caso se le recomendará para que acuda a su médico especialista tratante.

COSTOS E INCENTIVOS: Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio, su participación no le generará ningún costo.

CONFIDENCIALIDAD: La investigadora registrará su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados en una revista científica, no se mostrará ningún dato que permita la identificación de las personas que participan en este estudio. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento.

DERECHOS DEL PACIENTE: Si usted decide participar en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier momento, o no participar de una parte del estudio sin perjuicio alguno.

CONSENTIMIENTO: Acepto voluntariamente participar en este estudio, he comprendido perfectamente la información que se me ha brindado sobre las cosas que van a suceder si participo en el proyecto, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento.

Firma y Huella del Participante
 Nombre: BERTHA LUZ HUARCAYA
 DNI: 21559515
 Fecha:

Firma y Huella del Investigador
 Nombre: Aaron Rojas Sánchez
 DNI: 47137951
 Fecha:

3

CONSENTIMIENTO INFORMADO

“Características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022”

Investigador: Bachiller en Odontología Aaron Rojas Sánchez
 Asesor: Dr. Manuel Ricardo Rojas Morales

INTRODUCCIÓN: Lo estoy invitando a participar del estudio de investigación para Optar el Título de Cirujano Dentista llamado: “Características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022”. Este es un estudio desarrollado por Bachiller en Odontología Aaron Rojas Sánchez, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.

MOLESTIAS O RIESGOS: No existe ninguna molestia o riesgo mínimo al participar en este trabajo de investigación. Usted es libre de aceptar o de no aceptar.

BENEFICIOS: No existe beneficio directo para usted por participar de este estudio. Sin embargo, se le informará de manera personal y confidencial de algún resultado que se crea conveniente que usted tenga conocimiento. Los resultados también serán archivados en las historias clínicas de cada paciente y de ser el caso se le recomendará para que acuda a su médico especialista tratante.

COSTOS E INCENTIVOS: Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio, su participación no le generará ningún costo.

CONFIDENCIALIDAD: La investigadora registrará su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados en una revista científica, no se mostrará ningún dato que permita la identificación de las personas que participan en este estudio. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento.

DERECHOS DEL PACIENTE: Si usted decide participar en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier momento, o no participar de una parte del estudio sin perjuicio alguno.

CONSENTIMIENTO: Acepto voluntariamente participar en este estudio, he comprendido perfectamente la información que se me ha brindado sobre las cosas que van a suceder si participo en el proyecto, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento.

Firma y Huella del Participante
 Nombre: Juan Carlos Hernandez Roca
 DNI: 80070639
 Fecha:

Firma y Huella del Investigador
 Nombre: Aaron Rojas Sánchez
 DNI: 47137951
 Fecha:

3

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
TESIS

"Características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022"

N.º ficha: 001
Sexo: M
Edad: 35

INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta que Ud. considere correcta.

Características de la prótesis parcial removible

- ¿Utiliza o ha utilizado alguna vez prótesis parcial removible para sustituir sus piezas dentarias perdidas?
Si () No ()
- ¿Cuál fue material de la cual se confeccionó su PPR?
Con base metálica () Acrílica ()
- ¿Cuántos años tiene usando su prótesis dental?
3 años

Inconvenientes en el uso

- ¿Siente que su prótesis presenta inconvenientes al momento de usarla?
Si () No ()
- ¿Qué tipo de inconveniente presenta su PPR?
Problemas dental ()
Alteración o lesión en mucosa oral ()
Problemas en la prótesis removible ()
Alteración en la masticación y deglución ()
Alteración en la fonación ()
Xerostomía ()
Aflojamiento de la PPR ()
- este inconveniente es por superar la :
Masticación () Estética () fonética ()
Observación:

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
TESIS

"Características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022"

N.º ficha: 015
Sexo: M
Edad: 48

INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta que Ud. considere correcta.

Características de la prótesis parcial removible

- ¿Utiliza o ha utilizado alguna vez prótesis parcial removible para sustituir sus piezas dentarias perdidas?
Si () No ()
- ¿Cuál fue material de la cual se confeccionó su PPR?
Con base metálica () Acrílica ()
- ¿Cuántos años tiene usando su prótesis dental?
8 años

Inconvenientes en el uso

- ¿Siente que su prótesis presenta inconvenientes al momento de usarla?
Si () No ()
- ¿Qué tipo de inconveniente presenta su PPR?
Problemas dental ()
Alteración o lesión en mucosa oral ()
Problemas en la prótesis removible ()
Alteración en la masticación y deglución ()
Alteración en la fonación ()
Xerostomía ()
Aflojamiento de la PPR ()
- este inconveniente es por superar la :
Masticación () Estética () fonética ()
Observación:

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
TESIS

"Características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022"

N.º ficha: 010
Sexo: F
Edad: 60

INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta que Ud. considere correcta.

Características de la prótesis parcial removible

- ¿Utiliza o ha utilizado alguna vez prótesis parcial removible para sustituir sus piezas dentarias perdidas?
Si () No ()
- ¿Cuál fue material de la cual se confeccionó su PPR?
Con base metálica () Acrílica ()
- ¿Cuántos años tiene usando su prótesis dental?
5 años

Inconvenientes en el uso

- ¿Siente que su prótesis presenta inconvenientes al momento de usarla?
Si () No ()
- ¿Qué tipo de inconveniente presenta su PPR?
Problemas dental ()
Alteración o lesión en mucosa oral ()
Problemas en la prótesis removible ()
Alteración en la masticación y deglución ()
Alteración en la fonación ()
Xerostomía ()
Aflojamiento de la PPR ()
- este inconveniente es por superar la :
Masticación () Estética () fonética ()
Observación:

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
TESIS

"Características de la prótesis parcial removible e inconvenientes en el uso en pacientes atendidos en consultorios dentales del distrito de Ica - Perú 2022"

N.º ficha: 009
Sexo: M
Edad: 53

INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta que Ud. considere correcta.

Características de la prótesis parcial removible

- ¿Utiliza o ha utilizado alguna vez prótesis parcial removible para sustituir sus piezas dentarias perdidas?
Si () No ()
- ¿Cuál fue material de la cual se confeccionó su PPR?
Con base metálica () Acrílica ()
- ¿Cuántos años tiene usando su prótesis dental?
3 años

Inconvenientes en el uso

- ¿Siente que su prótesis presenta inconvenientes al momento de usarla?
Si () No ()
- ¿Qué tipo de inconveniente presenta su PPR?
Problemas dental ()
Alteración o lesión en mucosa oral ()
Problemas en la prótesis removible ()
Alteración en la masticación y deglución ()
Alteración en la fonación ()
Xerostomía ()
Aflojamiento de la PPR ()
- este inconveniente es por superar la :
Masticación () Estética () fonética ()
Observación: